



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2568

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 15/2568

สภาวะอากาศ

ในระยะครึ่งแรกของเดือนสิงหาคม บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตก โดยส่วนใหญ่อยู่บริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก โดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักในบางแห่ง สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ส่วนภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ สำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังปานกลาง ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในบางช่วง

คำเตือน

ในระยะครึ่งแรกของเดือนนี้ มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวในทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร

ระยะนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกชุก ก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก และควรหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรก หากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำ ควรสวมรองเท้าบูททุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู

สัตว์เลี้ยง เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นและเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบเช่น โคและกระบือ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรดูแลหลังคาโรงเรือนอย่าให้รั่วซึมและแผงกำบังฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน หนาวเย็น อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย

สัตว์น้ำ เกษตรกรควรดูแลสภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยงและในช่วงที่มีฝนตกไม่ควรปล่อยให้ น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนแล้วค่อยปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยงในภายหลัง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ำ

ไม้ผล ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันดินและอากาศจะมีความชื้นสูง เกษตรกรควรป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคแคงเกอร์ในส้ม และโรคใบติดในทุเรียน เป็นต้น สำหรับไม้ผลที่อยู่ในระยะให้ผลผลิต เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ผลที่เน่าเสีย ร่วงหล่น และเปลือกผลไม้ กองอยู่ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช แต่ควรนำไปกำจัดนอกบริเวณสวน เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่ไปยังต้นพืช


เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา





ออกประกาศวันที่ 1 สิงหาคม 2568

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.02-3992322

AS

พยากรณ์อากาศเกษตรรายปีักษ์
ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2568



			
ความสูง ของคลื่น	อุณหภูมิ (°ซ.)	จำนวนชั่วโมง ที่มีแสงแดด	น้ำระเหย