



พยากรณ์อากาศเกษตรรายปี
ระหว่างวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 14/2566

สภาวะอากาศ

ในระยะครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมจะมีฝนตกชุกมากขึ้น จากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่เลื่อนกลับลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนอีกครั้ง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นระยะๆ และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยได้ตลอดแนวด้านตะวันออกของประเทศ

คำเตือน

ในระยะครึ่งหลังของเดือนนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ แล้วเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จึงขอเกษตรกรให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อเกษตรกร


สภาพอากาศในระยะครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมนี้ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น ทำให้สภาพดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งอาจทำให้ผลผลิตลดลงและเสียหายได้ ส่วนพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรจัดเตรียมวัสดุสำหรับกันน้ำ และอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

สัตว์เลี้ยง ในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของทุกปีมีลักษณะภูมิอากาศที่แปรปรวน โดยสภาพอากาศเย็นและความชื้นสูงซึ่งอาจส่งผลทำให้โค และกระบือของเกษตรกร เครียด อ่อนแอ และมีโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย ทำให้มีโรคระบาดของโรคและสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม และ โรคไข้ซิกา เกษตรกรควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในช่วงฤดูฝนนี้

สัตว์น้ำ เกษตรกรที่เลี้ยงปลา เนื่องจากคุณภาพของน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน เพราะสภาพอากาศในฤดูฝน เช่น อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว ออกซิเจนต่ำ ความเป็นกรด-ด่าง ต่ำ เกิดจากฝนตกชะล้างความเป็นกรดจากดินสู่ น้ำ และความขุ่นในน้ำมากขึ้นหรือมีตะกอนแขวนลอยในน้ำสูง เป็นต้น ทำให้ปลามีอาการลอยหัว เปิด-ปิด กระพุ้งแก้มเร็ว เนื่องจากภาวะออกซิเจนหรือตะกอนในน้ำไปทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนของเหงือกลดลง จึงทำให้ปลาตายอย่างกะทันหัน ทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลาเป็นโรคนี้ ออกน้ำ ดังนั้นไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย และหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อให้น้ำรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้แก่ น้ำ และควรกั้นขอบบ่อให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ โดยจัดเตรียมวัสดุสำหรับกันน้ำและอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งานในช่วงฤดูฝนนี้

ไม้ผล ในช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่น เกษตรกรควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นภายในสวน ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา สำหรับ ไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่และเก็บเกี่ยว เกษตรกรไม่ควรปล่อยไม้ผลที่เน่าเสียและร่วงหล่น ตลอดจนเปลือกผลไม้กองอยู่ภายในบริเวณสวนนั้นให้น้ำไปกำจัดโดยการเผาหรือฝังให้ลึก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช

พยากรณ์อากาศเกษตรรายปักษ์
ระหว่างวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2566



						
ความสูง ของคลื่น	ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่	ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่	ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่	อุณหภูมิ °ซ.	จำนวนชั่วโมง ที่มีแสงแดด	น้ำระเหย