



## คำหมายอากาศเพื่อการเกษตรราย 3 เดือน

ระหว่างเดือน สิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 8/2569

### คำหมายลักษณะอากาศ

**1. ในระยะ 3 เดือนนี้** คาดว่า ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ในขณะที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 5 โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมประมาณ 400 - 500 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 575 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 450 - 550 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 633 มม.) ภาคกลางประมาณ 450 - 550 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 570 มม.) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 650 - 750 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 781 มม.) ภาคตะวันออก ประมาณ 800 - 900 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 856 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประมาณ 400 - 500 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 532 มม.) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 1,200 - 1,300 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 1,215 มม.)

สำหรับอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ ส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติ ประมาณ 0.5 - 1.0 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 - 34 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 32.3 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 24 - 26 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 24.3 องศาเซลเซียส)

**2. เดือนสิงหาคม** ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ยกเว้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ ในขณะที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 190 - 230 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 260 - 300 มม. ภาคกลางประมาณ 140 - 180 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 240 - 280 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 170 - 210 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 100 - 140 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 440 - 490 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1.0 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส

**3. เดือนกันยายน** ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ยกเว้น ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 ในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้ง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 160 - 200 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 200 - 250 มม. ภาคกลางประมาณ 190 - 240 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 360 - 410 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 300 - 350 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 110 - 150 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 400 - 450 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 – 1.0 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส

**4. เดือนตุลาคม** ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 30 ยกเว้น ภาคเหนือรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 20 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 70 - 120 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 50 - 90 มม. ภาคกลางประมาณ 80 - 130 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 130 - 170 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 170 - 220 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 160 - 200 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 240 - 290 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1.0 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน 33 - 35 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณภาคใต้ 32 - 34 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 24 - 26 องศาเซลเซียส

### **ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยในช่วง 3 เดือนนี้ (เป็นลักษณะทางสถิติของประเทศไทย)**

**เดือนสิงหาคม** ตามปกติเดือนนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีปริมาณฝนมากกว่าเดือนที่ผ่านมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย บริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

**เดือนกันยายน** ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้อาจได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทย บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง

**เดือนตุลาคม** เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนปริมาณฝนและอุณหภูมิ จะลดลง และเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย เริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ส่วนร่องมรสุมจะเลื่อนลงไป พาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัว เข้ามาใกล้หรือเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกและต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้

### ข้อควรระวัง


**เดือนสิงหาคม** ตามปกติเดือนนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีปริมาณฝนมากกว่าเดือนที่ผ่านมา จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

**เดือนกันยายน** ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศไทยและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย นอกจากนี้อาจได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาสลายตัวใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศ

**เดือนตุลาคม** มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออก และต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่พายุดังกล่าวเคลื่อนผ่านก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้ง น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่


เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

## คาดหมายปริมาณฝน(มิลลิเมตร)




ที่มา:ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

## คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย(องศาเซลเซียส)



ที่มา:ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

## คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย(องศาเซลเซียส)



ที่มา: ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา

คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด ปริมาณน้ำระเหย  
ปริมาณฝน และจำนวนวันฝนตก

| ภาค                |                                   | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม  |
|--------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| เหนือ              | อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 32-34   | 32-34   | 33-35   |
|                    | อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 23-25   | 24-26   | 23-25   |
|                    | จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน) | 3-4     | 4-6     | 6-7     |
|                    | ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)          | 3-5     | 3-4     | 3-4     |
|                    | ปริมาณฝน (มม.)                    | 190-230 | 160-200 | 70-120  |
|                    | จำนวนวันฝนตก (วัน)                | 20-22   | 17-19   | 10-12   |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 32-34   | 32-34   | 33-35   |
|                    | อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 24-26   | 24-26   | 23-25   |
|                    | จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน) | 3-6     | 3-6     | 5-8     |
|                    | ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)          | 3-6     | 3-5     | 3-5     |
|                    | ปริมาณฝน (มม.)                    | 260-300 | 200-250 | 50-90   |
|                    | จำนวนวันฝนตก (วัน)                | 18-20   | 17-19   | 8-10    |
| กลาง               | อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 33-35   | 33-35   | 34-36   |
|                    | อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 24-26   | 24-26   | 24-26   |
|                    | จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน) | 4-5     | 5-6     | 5-7     |
|                    | ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)          | 4-5     | 4-5     | 3-4     |
|                    | ปริมาณฝน (มม.)                    | 140-180 | 190-240 | 80-130  |
|                    | จำนวนวันฝนตก (วัน)                | 17-19   | 18-20   | 13-15   |
| ตะวันออกเฉียงใต้   | อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 32-34   | 32-34   | 33-35   |
|                    | อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 25-27   | 25-27   | 24-26   |
|                    | จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน) | 3-4     | 3-4     | 5-6     |
|                    | ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)          | 3-4     | 3-4     | 3-4     |
|                    | ปริมาณฝน (มม.)                    | 240-280 | 360-410 | 130-170 |
|                    | จำนวนวันฝนตก (วัน)                | 17-19   | 18-20   | 15-17   |

คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด ปริมาณน้ำระเหย  
ปริมาณฝน และจำนวนวันฝนตก

| ภาค                |                                   | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม  |
|--------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| ภาคใต้ฝั่งตะวันออก | อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 33-35   | 32-34   | 32-34   |
|                    | อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 24-26   | 24-26   | 23-25   |
|                    | จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน) | 3-6     | 4-6     | 4-5     |
|                    | ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)          | 3-4     | 3-4     | 3-4     |
|                    | ปริมาณฝน (มม.)                    | 100-140 | 110-150 | 160-200 |
|                    | จำนวนวันฝนตก (วัน)                | 14-16   | 15-17   | 17-19   |
| ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  | อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 31-33   | 31-33   | 32-34   |
|                    | อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (°ซ.)        | 24-26   | 24-26   | 23-25   |
|                    | จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดด (ชม./วัน) | 4-5     | 4-5     | 4-5     |
|                    | ปริมาณน้ำระเหย (มม./วัน)          | 3-4     | 3-4     | 3-4     |
|                    | ปริมาณฝน (มม.)                    | 440-490 | 400-450 | 240-290 |
|                    | จำนวนวันฝนตก (วัน)                | 19-21   | 21-23   | 21-23   |

## ผลกระทบต่อการเกษตร

ประเทศไทยตอนบน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก)

**เดือนสิงหาคม** เป็นช่วงฤดูฝน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ กับฝนตกหนักมากบางพื้นที่ เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบน กระทบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงในบางช่วง สำหรับในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น

ในช่วงที่มีฝนตกหนักมากหรือฝนตกหนักติดต่อกัน อาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง รวมทั้งจัดเตรียมอาหารสัตว์ น้ำกินสำหรับสัตว์ และระบบส่องสว่างยามค่ำคืน เอาไว้ให้พร้อมใช้งาน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรยกขอบบ่อให้สูงขึ้นและจัดเตรียมอุปกรณ์สูบน้ำเอาไว้ให้พร้อม สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำขังในแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชเป็นเวลานานเกิน 7 วัน เพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้

สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วงลูกยางเน่าในยางพารา โรคยอดเน่ารากเน่าในสับปะรด เป็นต้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลหลังคาโรงเรือนและแผงก้างฝนสาต่ออย่าให้มีรอยรั่วซึม เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน รวมทั้งดูแลโรงเรือนให้อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงหนาวเย็นจนอ่อนแอ นอกจากนี้ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นและเป็นเวลานานเพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โคและกระบือ เป็นต้น

ในช่วงฤดูฝนศัตรูสัตว์และแมลงต่างๆ เช่น ยุง เหลือบ รัน และไร เป็นต้น จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรไม่ควรปล่อยให้ศัตรูสัตว์ดังกล่าวมารบกวนสัตว์เลี้ยง เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงชะงักการเจริญเติบโต และศัตรูสัตว์บางชนิดอาจเป็นพาหะนำโรคมานสู่สัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ควรหมั่นสังเกตบริเวณโรงเรือน เพราะอาจมีสัตว์มีพิษและศัตรูสัตว์ เช่น งู ตะขาบ และแมงป่อง เป็นต้น เข้ามาอาศัยหลบฝนในบริเวณโรงเรือน ทำให้สัตว์เลี้ยงตื่นและอาจทำร้ายสัตว์เลี้ยงได้ หากพบควรรีบจัดการให้ออกไปจากโรงเรือนโดยเร็ว ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรติดตั้งดวงไฟเหนือบ่อเลี้ยง เพื่อล่อแมลงตัวเต็มวัยให้มาเล่นแสงไฟตอนกลางคืนและตกลงในบ่อเลี้ยงเป็นอาหารเสริมสัตว์น้ำได้

อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำโตได้ขนาดควรจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยง ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และในช่วงที่ทะเลมีคลื่นจัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

**เดือนกันยายน** เป็นช่วงฤดูฝน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ กับฝนตกหนักมากบางพื้นที่ เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบน บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก กระทบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงเป็นช่วงๆ สำหรับในระยะครึ่งหลังของเดือน

ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง โดยเฉพาะทางตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น

ในช่วงที่มีฝนตกหนักมากหรือฝนตกหนักติดต่อกันอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวโดยอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่มเกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรและโคนต้นพืชนานทำให้รากพืชขาดอากาศ ต้นพืชตายได้ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ เช่น โค และกระบือ เป็นต้น สำหรับในช่วงที่มีน้ำหลากอาจมีสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ และแมงป่อง เป็นต้น ลอยมากับน้ำ เกษตรกรควรระวังและป้องกันอันตรายไว้ด้วย

สำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแอนแทรคโนสในพืชไร่และพืชผัก ตลอดจนโรคหน้ากริดยางในยางพารา เป็นต้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลหลังคาโรงเรือนอย่าให้รั่วซึม และแผงกำบังฝนสาดให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันสัตว์เปียกฝน หนาวเย็นจนอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งหมั่นสำรวจบริเวณโรงเรือน เพราะอาจมีสัตว์มีพิษหรือศัตรูสัตว์เข้ามาอาศัยหลบฝนทำให้สัตว์เลี้ยงตื่นและอาจทำอันตรายแก่สัตว์เลี้ยงได้ หากพบควรรีบจัดการให้ออกไปจากโรงเรือน โดยเร็ว

ในช่วงฤดูฝนแมลงและศัตรูสัตว์ เช่น ยุง เหลือบ รัน และไร เป็นต้น จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูสัตว์ดังกล่าวมารบกวนสัตว์เลี้ยงทำให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโต และศัตรูสัตว์บางชนิดอาจนำโรคมาสู่สัตว์เลี้ยงได้ ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรติดตั้งดวงไฟล่อแมลงเหนือบ่อเลี้ยงเพื่อให้แมลงตัวเต็มวัยมาเล่นแสงไฟในตอนกลางคืนและตกลงไปในบ่อเลี้ยงเป็นอาหารเสริมของสัตว์น้ำได้

สำหรับในช่วงปลายเดือนปริมาณและการกระจายของฝนจะเริ่มลดลงโดยเฉพาะทางตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง

อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำโตได้ขนาดควรจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยง ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และในช่วงที่ทะเลมีคลื่นจัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

**เดือนตุลาคม** เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว ประเทศไทยตอนบนอากาศจะเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณและการกระจายของฝนลดลง ส่วนทางตอนล่างของภาคกลางและภาคตะวันออกจะยังคงมีฝนตกชุกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางตอนล่างของภาคกลาง

และภาคตะวันออก กระทบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงเป็นช่วงๆ สำหรับในระยะครึ่งหลังของเดือนนี้ ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง โดยเฉพาะทางตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า อนึ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ระยะนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งควรเตรียมจัดหาวัสดุสำหรับทำแผงกำบังลมหนาว โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็กควรจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือนให้กับสัตว์เลี้ยงไว้ด้วย เพื่อป้องกันสัตว์หนาวเย็น เนื่องจากสัตว์ที่ยังเล็กจะมีความต้านทานอากาศหนาวได้น้อยกว่าสัตว์ที่โตเต็มวัย

สำหรับปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง เกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้ รวมทั้งวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงแล้ง ส่วนไม้ผลที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว เช่น ลิ้นจี่และลำไย เป็นต้น เกษตรกรควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก และกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นให้โล่งเตียน เมื่อมีอากาศหนาวเย็นเพียงพอและยาวนานที่เหมาะสมก็จะกระตุ้นให้พืชแตกตาดอกได้ดี นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน เป็นต้น ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ

ส่วนในบางช่วงอาจมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เกิดได้บางพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงที่บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุม เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งและปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่กลางแจ้งขณะฝนฟ้าคะนอง รวมทั้งควรผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นกิ่งไม้ผลให้มั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันกิ่งฉีกหัก ต้นโค่นล้ม เมื่อมีลมแรง นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาสูงๆ ขณะลมแรง

สำหรับพื้นที่ซึ่งความชื้นในดินยังคงมีเพียงพอ เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชในช่วงปลายฤดูฝนยังคงทำได้ แต่ควรมีน้ำสำรองเอาไว้ให้พืชในระยะเจริญเติบโตและระยะผลิดอกออกผล โดยเฉพาะในช่วงที่พืชให้ผลผลิตจะเป็นช่วงที่พืชต้องการน้ำมากที่สุดหากได้รับน้ำไม่เพียงพอจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพ หากขาดน้ำเป็นเวลานานจะทำให้ต้นพืชตาย สูญเสียผลผลิตโดยสิ้นเชิง

อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำได้ขนาดควรจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยง ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และในช่วงที่ทะเลมีคลื่นจัด เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

## ภาคใต้

**เดือนสิงหาคม** เป็นช่วงฤดูฝน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีกำลังแรงเป็นช่วงๆ สำหรับปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น โดยทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าทางฝั่งตะวันออกกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น

เดือนนี้จะมีฝนตกชุกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมดังกล่าวจะมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าทางฝั่งตะวันออก สำหรับในช่วงที่มีฝนตกหนักมากและฝนตกหนักติดต่อกันอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง และจัดเตรียมอาหารสัตว์รวมทั้งน้ำกินสำหรับสัตว์ตลอดจนระบบส่องสว่างยามค่ำคืนเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน หากเกษตรกรต้องอพยพไปด้วยควรจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มเอาไว้ให้พร้อม ส่วนพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรขุดลอกคูคลองและทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกพืช เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร รวมทั้งขุดลอกดินดอนปากแม่น้ำให้น้ำไหลได้สะดวก

ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคใบยางร่วงในยางพารา และโรคยอดเน่าในปาล์มน้ำมัน เป็นต้น ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์เลี้ยงอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรยกขอบบ่อเลี้ยงให้สูงขึ้น และจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน และไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรง แต่ควรเก็บน้ำในบ่อพักก่อนปล่อยลงสู่บ่อเลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย และหลังจากฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำ เพื่อป้องกันน้ำแยกชั้น และเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่ น้ำ

ส่วนทางฝั่งตะวันออกจะมีฝนในช่วงบ่ายค่า ปริมาณและการกระจายของฝนจะน้อยกว่าทางฝั่งตะวันตก เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ พืชสวน และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ

อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งควรระวังและป้องกันคลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่ง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำเจริญเติบโตได้ขนาดควรจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สำหรับชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และในช่วงที่ทะเลมีคลื่นจัดเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

**เดือนกันยายน** เป็นช่วงฤดูฝน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีกำลังแรงเป็นช่วงๆ สำหรับปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณและการกระจายมากกว่าทางฝั่งตะวันออก กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ หนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น

สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าทางฝั่งตะวันออกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกและขุดลอกคูคลองและดูแลทางระบายน้ำตลอดจนสันดอนปากแม่น้ำอย่าให้ตื้นเขิน ติดขัด น้ำระบายได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้สัตว์อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ส่วนในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกัน ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคยอดเน่าในปาล์มน้ำมัน โรคราสนิมในกาแฟ และโรคใบยางร่วงในยางพารา เป็นต้น ส่วนพื้นที่การเกษตรที่เป็นที่ลุ่มเกษตรกรไม่ควรปล่อยให้น้ำขังในแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชนาน ทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้

ส่วนทางฝั่งตะวันออกจะมีฝนในช่วงบ่ายค่า ปริมาณและการกระจายของฝนจะน้อยกว่าทางฝั่งตะวันตก เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชไร่ พืชสวน และพืชผัก เป็นต้น ซึ่งศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช เช่น ใบอ่อนและยอดอ่อน ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง และด้อยคุณภาพ หนึ่ง เกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชหรือขยายพันธุ์พืช ทำได้ในช่วงนี้หากความชื้นในดินมีเพียงพอ

หนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งควรระวังและป้องกันคลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่ง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำเจริญเติบโตได้ขนาดควรทยอยจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สำหรับชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และในช่วงที่ทะเลมีคลื่นลมแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

**เดือนตุลาคม** เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทางฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ หนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น

สำหรับในช่วงที่มีฝนตกหนักมากหรือฝนตกหนักติดต่อกัน โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออก อาจทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยอพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง และจัดเตรียมอาหารสัตว์ น้ำกินสำหรับสัตว์ตลอดจนระบบส่องสว่างยามค่ำคืนเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน ส่วนผู้ที่เลี้ยง

สัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงควรยกขอบบ่อให้สูงขึ้นและจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังสภาพน้ำที่เปลี่ยนไปเนื่องจากน้ำจืดที่ไหลลงทะเลในปริมาณมาก

ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น รากเน่าโคนเน่าในไม้ผล โรคแอนแทรคโนสในพืชไร่และพืชผัก โรคใบยางร่วงในยางพารา โรคใบติดในทุเรียน โรคแคงเกอร์ในพืชตระกูลส้ม เป็นต้น โดยดูแลแปลงปลูกพืชให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง เพื่อลดความชื้นสะสมในพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ไม่ควรกองผลไม้ที่ร่วงหล่น เน่าเสีย และเปลือกผลไม้ ไว้ในบริเวณสวน เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช

อนึ่ง ในช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรง คลื่นลมบริเวณทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น เกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายจากคลื่นแรงพัดเข้าหาฝั่ง ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากสัตว์น้ำเจริญเติบโตได้ขนาดควรจับขายไปก่อนบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยง ส่วนชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และในช่วงที่ทะเลมีคลื่นลมแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง โดยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา


ออกประกาศ สิงหาคม 2569

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


<http://www.tmd.go.th/agromet.php>

Adisorn Somwang


แผนที่แสดงปริมาณฝนรวม และปริมาณฝนรวมที่ต่างจากค่าปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569




แผนที่แสดงปริมาณฝนรวม และปริมาณฝนรวมที่ต่างจากค่าปกติเดือนมิถุนายน



แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตกในเดือนมิถุนายนและจำนวนวันที่ฝนตกน้อยกว่า 3 ม.ม. ติดต่อกัน  
จนถึงวันที่30มิถุนายน2569



ดรชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (SPI) ราย60วันและราย90วัน




ดรชนีความแห้งแล้งของฝนที่ต่างจากค่าปกติ (SPI) เป็นดรชนีที่พัฒนาขึ้น เพื่อแสดงถึงการขาดแคลนฝนในช่วงเวลา (timescale) 2 และ3 เดือน โดยใช้ข้อมูลปริมาณฝนเพียงอย่างเดียว และจำแนกเป็นระดับความรุนแรง ดังนี้


|                            |         |                    |
|----------------------------|---------|--------------------|
| SPI มากกว่าหรือเท่ากับ 2   | หมายถึง | ฝนชุกมากที่สุด     |
| SPI = 1.50 ถึง 1.99        | หมายถึง | ฝนชุกมาก           |
| SPI = 1.00 ถึง 1.49        | หมายถึง | ฝนชุกปานกลาง       |
| SPI = -0.99 ถึง 0.99       | หมายถึง | ฝนใกล้เคียงปกติ    |
| SPI = -1.00 ถึง -1.49      | หมายถึง | ฝนแล้งปานกลาง      |
| SPI = -1.50 ถึง -1.99      | หมายถึง | ฝนแล้งรุนแรง       |
| SPI น้อยกว่าหรือเท่ากับ -2 | หมายถึง | ฝนแล้งรุนแรงที่สุด |

## เดือนสิงหาคม


ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนสิงหาคม




น้ำระเหยเฉลี่ย เดือนสิงหาคม



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนสิงหาคม




อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนสิงหาคม




## อุณหภูมิดินเดือนสิงหาคม


**อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่0ซม.**




**อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่5ซม.**




**อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่10ซม.**




**อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่20ซม.**



**อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่50ซม.**




**อุณหภูมิดินเฉลี่ยที่100ซม.**




## เดือนกันยายน


ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนกันยายน




อุณหภูมิเฉลี่ย เดือนกันยายน




อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนกันยายน



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนกันยายน




## อุณหภูมิดินเดือนกันยายน




## เดือนตุลาคม


ปริมาณฝนเฉลี่ย เดือนตุลาคม




น้ำระเหยเฉลี่ย เดือนตุลาคม



อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนตุลาคม



อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนตุลาคม



## อุณหภูมิดินเดือนตุลาคม

