




พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อพืชและสัตว์เศรษฐกิจ


ระหว่าง วันที่ 5 - 11าคม 2567

ข้อควร
ระวัง


ระวัง อันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มและที่ราบเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน




ภาคเหนือ




ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ




ภาคกลาง



ภาคตะวันออก



ภาคใต้-ออก



ภาคใต้-ตก



พยากรณ์อากาศเกษตร เพื่อ กาแฟ



ลักษณะอากาศ ระยะนี้ ยังมีฝนตกชุก โดยมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ สำหรับ คลื่นลม บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำแนะนำ

เกษตรกรที่ปลูกกาแฟ ควรเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะ โรคเน่าดำ และโรคราสนิม โดยเกษตรกรหมั่นสำรวจดูแลแปลงปลูก ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง เพื่อให้แสงแดดส่องถึง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และกำจัดวัชพืช เพื่อเพื่อกำลายแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืช



ระยะนี้ ยังมีฝนตกชุก
ระวัง โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
เช่น โรคเน่าดำ โรคราสนิม ..



โรคเน่าดำกาแฟ
พบ มักระบาดในช่วงที่มีฝนตกชุก



หมั่นสำรวจแปลงปลูก
หากพบการระบาดของโรค
ควรรีบป้องกันและกำจัด



พยากรณ์อากาศเกษตรเพื่อกาแฟ

ระหว่างวันที่ 5 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 32/2567

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 5-7 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 8-11 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 5-7 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 8-11 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 5-7 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 8-11 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 5-7 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 8-11 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 5-6 และ 9-11 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 7-8 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 5-6 และ 9-11 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 7-8 ส.ค. 67 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 5-7 ส.ค. ขอให้เกษตรกร ระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อกาแฟ

บริเวณประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 5-7 ส.ค. จะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเกษตรกรรมควรระวังอันตรายและเตรียมการป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก จากสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกต่อเนื่องทำให้บางพื้นที่สภาพดินมีความชื้นแฉะหรือมีน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์ตากฝนหรืออยู่ในที่ชื้นแฉะ เพราะจะทำให้สัตว์เสี่ยงอ่อนแอและเจ็บป่วยได้ง่าย ส่วนในช่วงวันที่ 8-11 ส.ค. ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เว้นแต่ในช่วงวันที่ 7-8 ส.ค. เกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกกาแฟ ซึ่งอยู่ในระยะพัฒนาผลจากผลอ่อนที่มีขนาดเล็กสีเขียวเป็นผลที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ในสภาวะอากาศที่มีฝนตกหนาแน่นและมีความชื้นในอากาศสูง และในบางช่วงมีฝนตกๆ หยุดๆ สลับกับมีแสงแดดจัด เกษตรกรควรเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรคราสนิมกาแฟ และโรคเน่าดำกาแฟ

โรคราสนิมกาแฟ (Coffee Rust Disease) สาเหตุเกิดจากเชื้อรา อาการที่พบเห็นจะเป็นจุดสีน้ำตาลเล็กๆ ต่อมาจะขยายใหญ่ขึ้นจนเป็นแผลสีส้ม ด้านตรงข้ามบริเวณใต้ใบมักเป็นแผลแห้งสีน้ำตาล มักจะแพร่ระบาดมากในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง โรคนี้จะระบาดรุนแรงมากขึ้น ในช่วงที่มีฝนตกๆ หยุดๆ สลับกับมีแสงแดดจัด

โรคเน่าดำกาแฟ (Black root) สาเหตุเกิดจากเชื้อรา จะแสดงออกที่ใบ กิ่ง และผลที่กำลังพัฒนาในช่วงฝนตกชุก โดยระยะเริ่มแรกใบของกาแฟจะเน่ามีสีดำก่อน แล้วจะลุกลามไปยังกิ่งและผลที่กำลังเจริญเติบโต โดยผลกาแฟที่กำลังเจริญเติบโตมีสีเขียวจะกลายเป็นสีดำและร่วง และเมื่ออากาศแห้งเห็นเส้นใยสีขาวปกคลุมก้านผลกาแฟคล้ายใยแมงมุมสีขาว การเน่าของใบกาแฟอาจลุกลามเข้าสู่ตรงกลางของพุ่มกาแฟ

การป้องกันและกำจัด เกษตรกรควรหมั่นสำรวจต้นกาแฟ เพราะเชื้อราจะทำลายต้นกาแฟตั้งแต่ระยะต้นกล้าและต้นที่โตแล้ว การป้องกันและลดความรุนแรงของโรค เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งของกาแฟให้โปร่ง เพื่อให้แสงแดดส่องถึง และอากาศถ่ายเทได้สะดวก รวมทั้งกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อทำลายแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อ หากพบการระบาดให้ตัดกิ่งที่เป็นโรคออกแล้วเก็บรวบรวมส่วนที่เป็นโรคไปเผาทำลาย หรืออาจใช้สารเคมีฉีดพ่นป้องกันกำจัด




โรคราสนิม



โรคเน่าดำ

ปริมาณฝนสะสม 7 วันที่ผ่านมา
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2567



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศ วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา 02-3669336

[PK]