

พยากรณ์อากาศเพื่อมันสำปะหลัง (24 - 30 ส.ค. 69)

สภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยง (27 - 30 ส.ค. 69)



ฝนตกหนักถึงหนักมาก
60-70%
ของพื้นที่

โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออก

ระวังแมลงหวี่ขาวพาหะ โรคใบด่าง

สภาพอากาศชื้น-ลมพัดแรง
ช่วยให้แมลงหวี่ขาวขยายพันธุ์
และแพร่กระจายโรคได้เร็ว



ความชื้นสะสมเสี่ยง “โรครากเน่า”

น้ำขังแฉะ ทำให้รากขาดอากาศ เสี่ยงติด
โรคเชื้อราหรือแบคทีเรียได้ง่าย

พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ (27-30 ส.ค.)



ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
คลื่นสูง 2 - 3 เมตร



ภาคกลาง (ด้านตะวันตก)
น้ำล้นตลิ่ง/ดินชุ่มน้ำสะสม



ภาคตะวันออก
น้ำท่วมฉับพลัน/น้ำป่าไหลหลาก

แนวทางจัดการและป้องกัน



สำรวจแปลงทุก 7-14 วัน

สังเกตยอดอ่อน หากมีอากาศใบด่าง
หจิกย่น หรือเหลือง ให้รีบกำจัดทันที

ทำทางระบายน้ำและงดปุ๋ยไนโตรเจน



ป้องกันน้ำขังโคนต้นและเสี่ยงการทำให้ใบอวบน้ำ ซึ่งจะดึงดูดแมลงศัตรูพืช

กำจัดต้นที่เป็นโรคและควบคุมแมลง



ฝังกลบหรือบดสับต้นที่ติดเชื้อ และพ่นสารกำจัดแมลงหวี่ขาวตามคำแนะนำ



พยากรณ์อากาศเพื่อมันสำปะหลัง ระหว่างวันที่ 24 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2569

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับที่ 34/2569

สภาวะอากาศ

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 24 – 26 ส.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 27 – 30 ส.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 24 – 26 ส.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 27 – 30 ส.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 24 – 26 ส.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 27 – 30 ส.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 24 - 26 ส.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 30 ส.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 24 และ 27 - 29 ส.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนและตอนกลางของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 25 - 26 และ 30 ส.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 24 - 26 และ 30 ส.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 29 ส.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ในช่วงวันที่ 24 - 26 ส.ค. 69 ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 27 - 30 ส.ค. 69 ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 - 34 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง ในวันที่ช่วง 27 - 30 ส.ค. 69 ขอให้เกษตรกรบริเวณตะวันออก และด้านตะวันตกของภาคกลาง ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งได้

สภาวะอากาศที่มีผลกระทบต่อมันสำปะหลัง

ตามประกาศสภาพอากาศในช่วงวันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2569 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และด้านตะวันตกของ ภาคกลาง โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในสภาพอากาศที่มีฝนชุก และความชื้นในดินสูงต่อเนื่องเช่นนี้ เป็น ปัจจัยเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคพืชและแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย โรคจากเชื้อราที่มักแสดงอาการเป็นผงขาว ราสนิม หรือแผลเป็นวงมีสปอร์ เช่น โรคราแป้งและโรคราน้ำค้าง ส่วนโรคจากแบคทีเรียมักทำให้พืชมีอาการฉ่ำน้ำ เน่าและ มีเมือกเยิ้ม หรือส่งกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ยังมีแมลงศัตรูพืชหลายชนิดขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มแมลงปากดูดและศัตรูพืชที่ชอบความชื้น ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนห่อใบข้าว และหนอนกินใบ เป็นต้น

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง สภาพอากาศที่มีฝนชุก ความชื้นในดินและอากาศสูง และท้องฟ้ามืดครึ้ม ต่อเนื่องเช่นนี้ เป็นปัจจัยเอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคพืชและแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งมีแมลงพาหะคอยแพร่เชื้อ เร่งให้สถานการณ์น่าเป็นห่วงยิ่งขึ้น สิ่งเกษตรกรต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงฝนตกหนักนี้ คือ


การแพร่ระบาดของแมลงหมีขาวยาสูบ (Whitefly) ซึ่งเป็นพาหะหลักของโรคใบด่างมันสำปะหลัง แมลงชนิดนี้มักแพร่กระจายและขยายพันธุ์ได้ดีในช่วงฤดูฝนหรือหลังฝนหยุดตก เมื่อลมพัดผ่านจะพาแมลงบินไปแพร่เชื้อในแปลงอื่นๆ ได้

สภาพน้ำขังและน้ำในแปลง เพราะฝนที่ตกหนักสะสมทำให้ดินชุ่มน้ำ รากมันสำปะหลังอาจขาดอากาศหายใจไม่สะดวก ต้นพืชอ่อนแอลง ซึ่งทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น รวมถึงโรคโคนเน่าและรากเน่า สำหรับแนวทางป้องกันเพื่อลดความเสียหาย เกษตรกรควรเน้นการจัดการและควบคุม

- หมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ ทุกๆ 7-14 วัน ควรเดินสำรวจแปลงอย่างละเอียด สังเกตยอดอ่อน หากพบใบมันสำปะหลังมีอาการหงิก ย่น ค้างลาย หรือมีสีเขียวสลับเหลือง ให้รีบดำเนินการทันที
- กำจัดต้นที่เป็นโรคออกทันที หากพบต้นแสดงอาการ ให้ทำลายทิ้งเพื่อตัดวงจรเชื้อไวรัส โดยใช้วิธีการฝังกลบดินลึก หรือการบดสับทำลาย และห้ามนำท่อนพันธุ์จากต้นที่เป็นโรคไปปลูกต่อเด็ดขาด
- ควบคุมแมลงพาหะ (แมลงหมีขาวยาสูบ) หากพบการระบาดของแมลงหมีขาว ให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดแมลงตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
- ทำทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำขังและเน่าเป็นเวลานานบริเวณโคนต้นมันสำปะหลัง เพื่อลดความเสี่ยงโรครากเน่าโคนเน่าและช่วยให้รากพืชยังคงหายใจได้ดี
- งดการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไปในช่วงนี้ เพราะจะทำให้ต้นมันสำปะหลังอวบน้ำ ใบสดอ่อน ซึ่งเป็นเป้าหมายของแมลงศัตรูพืชและทำให้โรคระบาดลุกลามเร็วยิ่งขึ้น

คาดหมายปริมาณฝนสะสม 7 วัน ข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2569



ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยา

เผยแพร่โดย ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา

ออกประกาศวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569

กรมอุตุนิยมวิทยา โทร.02-3669336

[PK]