



กรมอุตุนิยมวิทยา

๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 SUKHUMVIT ROAD, BANGKOK 10260, THAILAND

รายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตร

กันยายน 2568

Agrometeorological Report

September 2025

รายงานอากาศเลขที่ ๕๕๑.๕๘๖-๒๒-๒๕๖๘

Weather Report No. 551.586-22-2025

รายงานอตุณียมวิทยาเกษตร
กันยายน 2568

ส่วนอตุณียมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอตุณียมวิทยา
กรมอตุณียมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำนำ

วิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นอกจากต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพของลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศที่มีผลต่อการเกษตร ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา นับเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญต่อการค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางการเกษตร ตลอดจนการคาดหมายสภาพอากาศข้างหน้า ซึ่งมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินกิจการทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การให้น้ำ และการพ่นยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำรายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตรรายเดือน โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเชิงวิเคราะห์ การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และรายงานการระบาดของศัตรูพืช ให้แก่นักอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบ และใช้ค้นคว้าประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านการเกษตร การประมง การบริหารจัดการน้ำ และด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำ

ตุลาคม 2568

สารบัญ

	หน้า
1. สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย เดือนกันยายน 2568	1
2. การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนกันยายน 2568	4
3. รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนกันยายน 2568	15
4. แหล่งข้อมูล	19

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนกันยายน 2568	7
---	---

สารบัญรูป


รูปที่ 1 แผนที่แสดงเส้นทางเดินพายุไต้ฝุ่น “รากาซา (RAGASA, 2518)” , “บัวลอย (BUALOI, 2520)” และพายุโซนร้อน “ตาปะฮ์ (TAPAH, 2516)”	1
รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568	4
รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568	5
รูปที่ 4 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568	6
รูปที่ 5 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนกันยายน 2568	8
รูปที่ 6 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนกันยายน 2568	9
รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิเฉลี่ย เดือนกันยายน 2568	10
รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนกันยายน 2568	11
รูปที่ 9 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนกันยายน 2568	12
รูปที่ 10 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนกันยายน 2568	13
รูปที่ 11 แผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนกันยายน 2568	14

สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย

เดือนกันยายน 2568

สภาวะอากาศโดยทั่วไปเดือนกันยายน ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรงเป็นระยะๆ ลักษณะดังกล่าวทำให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกชุกหนาแน่น

สำหรับสภาวะอากาศเดือนกันยายนปีนี้ บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดเดือน จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “ตาปะฮ์ (TAPAH, 2516)” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกว่างตุง ประเทศจีน ในช่วงต้นเดือน ส่วนในช่วงปลายเดือนได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่น “รากาซา (RAGASA, 2518)” ที่เคลื่อนเข้ามาสลายตัวบริเวณประเทศเวียดนาม และไต้ฝุ่น “บัวลอย (BUALOI, 2520)” ที่เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกว่างบิญ ประเทศเวียดนามตอนบน ก่อนเคลื่อนเข้ามาสลายตัวบริเวณประเทศลาว ลักษณะดังกล่าวทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นกับมีรายงานน้ำท่วมหลายพื้นที่ โดยปริมาณฝนรวมตลอดเดือนสูงกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค และปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 9 อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยสูงกว่าค่าปกติ 0.3 องศาเซลเซียส รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้



รูปที่ 1 แผนที่แสดงเส้นทางเดินพายุไต้ฝุ่น “รากาซา (RAGASA, 2518)” , “บัวลอย (BUALOI, 2520)” และพายุโซนร้อน “ตาปะฮ์ (TAPAH, 2516)”

วันที่ 1-10 กันยายน 2568 : ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกือบตลอดช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย โดยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 7-8 กันยายน 2568 เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ตาปาย (TAPAH, 2516)” ที่เคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนในวันที่ 7 กันยายน 2568 ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นในวันที่ 8 กันยายน 2568 ก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกว่างตุง ประเทศจีน เมื่อเวลา 10.00 น. และอ่อนกำลังลงตามลำดับในเวลาต่อมา ทำให้ประเทศไทยตอนมีฝนตกหนาแน่น อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60-90 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 7-9 กันยายน 2568 มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณชายฝั่งตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนสูงสุดที่บริเวณประเทศไทยตอนบน วัดได้ 188.8 มิลลิเมตร ที่ โรงเรียนเทศบาล 1 อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2568 นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมหลายพื้นที่เกือบตลอดช่วงบริเวณจังหวัดอุดรธานี ลำปาง ลำพูน ตาก เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย ชัยภูมิ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สิงห์บุรี กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี จันทบุรี และชลบุรี สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นทางฝั่งตะวันตกของภาค โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 190.6 มิลลิเมตร ที่ สถานีทดลองยางวังทัง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 และมีน้ำท่วมบริเวณจังหวัดชุมพร ในช่วงวันที่ 1-3 กันยายน 2568 กับมีดินถล่ม ในวันที่ 1 กันยายน 2568

วันที่ 11-20 กันยายน 2568 : ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลาง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่กลางช่วง โดยพาดเข้าสู่ห่อความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 14-18 กันยายน 2568 ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังปานกลางตลอดช่วง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เกือบตลอดช่วง เว้นแต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฝนร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนร้อยละ 80-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนสูงสุดที่บริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 158.6 มิลลิเมตร ที่ สถานีอากาศเกษตรพลี๊ว จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 โดยมีรายงานน้ำท่วมในหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ลำปาง ตาก ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา อำนาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง และปราจีนบุรี สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นทางฝั่งตะวันตกของภาค โดยมีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ 40-90 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งเกือบตลอดช่วง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 118.0 มิลลิเมตร ที่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2568

วันที่ 21-30 กันยายน 2568 : ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบตลอดช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลัง

แรงในระยะกลางและปลายช่วง เนื่องจากอิทธิพลของไต้ฝุ่น “รากาซา (RAGASA, 2518)” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 24 กันยายน 2568 จากนั้นได้เคลื่อนผ่านชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้พร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน แล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับบริเวณประเทศเวียดนาม ในวันที่ 25 กันยายน 2568 นอกจากนี้ในระยะปลายช่วง ไต้ฝุ่น “บัวลอย (BUALOI, 2520)” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกว๋างบิญ ประเทศเวียดนามตอนบนพร้อมทั้งอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนในวันที่ 29 กันยายน 2568 จากนั้นได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศลาวและอ่อนกำลังลงตามลำดับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนในวันต่อมา ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคกลางมีฝนร้อยละ 30-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 26-27 กันยายน 2568 มีฝนร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 26-27 และ วันที่ 30 กันยายน 2568 มีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เกือบตลอดช่วง ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 236.0 มิลลิเมตร ที่ นิคมสร้างตนเองโนนสัง อ.โนนสัง จังหวัดอุดรดิตถ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 โดยมีรายงานน้ำท่วมในระยะครึ่งหลังของช่วงบริเวณจังหวัดลำพูน ลำปาง กำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน อุดรดิตถ์ แพร่ เชียงใหม่ สุโขทัย น่าน พะเยา เลย อำนาจเจริญ มหาสารคาม สุรินทร์ หนองบัวลำภู หนองคาย นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี สระแก้ว และ จันทบุรี สำหรับภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ในระยะต้นช่วง จากนั้นมีเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 50-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของภาค ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 125.7 มิลลิเมตร ที่ อำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2568 กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2568


อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติ 0.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36.7 องศาเซลเซียส ที่ อำเภอมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2568 อุณหภูมิต่ำที่สุด 20.6 องศาเซลเซียส ที่ สถานีอากาศเกษตรท่าพระ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2568

ปริมาณฝนเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 31.3 มิลลิเมตร (ร้อยละ 14) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51.4 มิลลิเมตร (ร้อยละ 20) ภาคกลาง 28.6 มิลลิเมตร (ร้อยละ 11) และภาคตะวันออก 43.9 มิลลิเมตร (ร้อยละ 12) เว้นแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติ 15.5 มิลลิเมตร (ร้อยละ 11) และ 37.6 มิลลิเมตร (ร้อยละ 9) ตามลำดับ

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลฝน อุณหภูมิ และภัยธรรมชาติ เป็นรายงานเบื้องต้น


2. ตาปะฮ์ (TAPAH) หมายถึง ชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง เป็นชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ตั้งโดยประเทศมาเลเซีย
3. รากาซา (RAGASA) หมายถึง กระโชก เป็นชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ตั้งโดยประเทศฟิลิปปินส์
4. บัวลอย (BUALOI) หมายถึง ขนมนชนิดหนึ่ง เป็นชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ตั้งโดยประเทศไทย

การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนกันยายน 2568




รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568

ในวันที่ 10 กันยายน 2568 จากการพิจารณาตรรกะดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออก และภาคใต้หลายพื้นที่



รูปที่ 3 แผนที่แสดงดรชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568

ในวันที่ 20 กันยายน 2568 จากการพิจารณาดรชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณ ที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้หลายพื้นที่




รูปที่ 4 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568


ในวันที่ 30 กันยายน 2568 จากการพิจารณาดรรชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้หลายพื้นที่

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมิวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนกันยายน 2568


ภาค	สถานี	ปริมาณฝน	จำนวนวัน ฝนตก (วัน)	อุณหภูมิ (°ซ.)			ความชื้น	ปริมาณน้ำ
		(มม.)		เฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	สัมพัทธ์ (%)	ระเหย (มม./วัน)
เหนือ	เชียงใหม่	284.8	20	26.8	31.4	22.4	84.1	4.1
	ลำปาง	239.7	19	26.5	31.6	23.8	87.5	3.6
	น่าน	193.8	13	27.4	32.3	24.5	81.7	3.9
	ศรีสะเกษ	303.1	20	28.2	32.6	25.3	86.8	3.1
	ดอยมูเซอร์	421.8	26	22.5	26.2	20.2	90.7	3.9
	พิจิตร	212.9	22	28.4	32.8	25.4	84.2	3.8
ตะวันออก	เลย	312.1	22	26.4	31.8	24.0	90.2	3.0
	สกลนคร	248.9	22	27.4	32.4	24.6	84.5	3.5
	นครพนม	207.1	22	27.3	32.1	24.0	89.2	4.3
	ท่าพระ	258.8	24	27.4	32.1	23.3	87.4	3.4
เฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	190.1	21	27.3	31.1	24.9	87.9	3.3
	อุบลราชธานี	537.5	27	27.0	31.8	23.5	87.4	3.0
	ศรีสะเกษ	395.1	26	27.4	31.6	25.0	86.9	3.7
	ปากช่อง	154.2	23	26.0	31.8	23.3	84.6	4.0
	สุรินทร์	314.2	23	27.3	32.1	24.4	86.3	4.2
กลาง	ตากฟ้า	345.8	27	27.7	32.4	23.7	88.2	4.3
	ชัยนาท	197.6	18	28.2	32.8	25.4	84.4	4.2
	อยุธยา	217.0	18	28.7	33.4	23.2	83.2	3.8
	ปทุมธานี	395.1	22	28.9	33.9	25.5	79.0	5.3
	ราชบุรี	285.5	19	28.0	33.2	25.3	82.8	3.8
	อุทุม	255.4	20	28.2	33.5	24.7	81.7	4.2
	กำแพงแสน	244.1	20	28.3	33.6	25.1	85.4	4.1
	บางนา	391.7	23	28.9	33.3	25.7	78.7	4.0
ตะวันออก	ละโว้	113.4	21	27.6	33.0	24.9	85.5	3.4
	ห้วยโป่ง	396.6	20	28.0	31.8	25.2	84.7	3.3
	พลี	871.6	28	27.2	31.0	24.5	88.3	2.9
ใต้	หนองพลับ	118.0	20	27.4	32.7	23.9	82.7	3.7
	สวี	142.8	20	27.0	31.9	24.3	86.8	2.8
	สุราษฎร์ธานี	195.3	19	27.4	33.0	24.0	83.2	4.0
	นครศรีธรรมราช	65.0	11	28.0	33.8	24.5	83.0	3.8
	พัทลุง	44.6	9	28.3	33.8	25.0	78.3	4.5
	คอหงส์	95.8	13	28.2	33.6	24.1	78.9	3.9
	ยะลา	218.7	16	27.5	33.7	23.4	80.7	4.1
หมายเหตุ T หมายถึง ฝนเล็กน้อยวัดปริมาณไม่ได้								




รูปที่ 5 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนกันยายน 2568




รูปที่ 6 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนกันยายน 2568




รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิจนเฉลี่ย เดือนกันยายน 2568




รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนกันยายน 2568



รูปที่ 9 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนกันยายน 2568



รูปที่ 10 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนกันยายน 2568



รูปที่ 11 แผนที่แสดงความขึ้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนกันยายน 2568

รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนกันยายน 2568

สำนักงานเกษตรจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจเดือนกันยายน 2568 ดังนี้

1. ศัตรูข้าว

พื้นที่ปลูกข้าวมีทั้งหมด 76 จังหวัด จำนวน 44,705,745 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 1.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,051 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.2 เพลี้ยกระโดดหลังขาว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 2,141 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.3 หนอนห่อใบข้าว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 24 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.4 เพลี้ยไฟข้าว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 240 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน
- 1.5 เพลี้ยจักจั่นสีเขียว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 373 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.6 หนอนกอข้าว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 120 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.7 โรคไหม้ข้าว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 6,865 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.8 โรคขอบใบแห้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,029 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.9 โรคใบสีส้ม มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 223 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.10 โรคใบขีดสีน้ำตาล มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 166 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน

2. ศัตรูมันสำปะหลัง

พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมีทั้งหมด 55 จังหวัด จำนวน 8,639,651 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 2.1 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,265 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-8 เดือน
- 2.2 ไรแดง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 6,218 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 6-8 เดือน

2.3 โรคพุ่มแจ้ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 915 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน

2.4 โรคโคนเน่าหัวเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 114 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน

2.5 โรคใบด่างมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,212,070 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-5 เดือน

2.6 โรคใบไหม้ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 301 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-5 เดือน

3. ศัตรูอ้อย

พื้นที่ปลูกอ้อยมีทั้งหมด 45 จังหวัด จำนวน 4,894,333 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

3.1 โรคใบขาวอ้อย มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 21,479 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุมากกว่า 9 เดือน

3.2 หนอนกออ้อย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,406 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยทุกช่วงอายุการปลูก

3.3 โรคเส้ดำ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 264 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุน้อยกว่า 4-9 เดือน

3.4 ดั๋งหนวดยาว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 167 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุ 4-9 เดือน

4. ศัตรูข้าวโพด

พื้นที่ปลูกข้าวโพดมีทั้งหมด 51 จังหวัด จำนวน 1,736,684 ไร่ พบการระบาดของหนอนกระทู้

ข้าวโพดลายจุด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 3,439 ไร่ ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อย

5. ศัตรูสับปะรด

พื้นที่ปลูกสับปะรดมีทั้งหมด 61 จังหวัด จำนวน 510,337 ไร่ พบการระบาดของโรคเหี่ยว มีแนวโน้ม

การระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 305 ไร่

6. ศัตรูมะพร้าว

พื้นที่ปลูกมะพร้าวมีทั้งหมด 69 จังหวัด จำนวน 1,072,966 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

6.1 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 44,292 ไร่

ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

6.2 แมลงดำหนาม มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 7,037 ไร่

ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

6.3 ดั๋งแรด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 6,304 ไร่

6.4 ดั๋งวง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 898 ไร่

6.5 ไร่สีขามะพร้าว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 671 ไร่

7. ศัตรูปาล์มน้ำมัน

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีทั้งหมด 69 จังหวัด จำนวน 5,313,004 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

7.1 ดั้วแรต มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,160 ไร่

7.2 โรคลำต้นเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 11,672 ไร่

7.3 หนอนปลอกเล็ก มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 807 ไร่

7.4 โรคทะลายเน่า มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 969 ไร่

7.5 ดั้วกุหลาบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 589 ไร่

7.6 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 87 ไร่

7.7 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 4,710 ไร่

7.8 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 835 ไร่

7.9 หนอนหน้าแมว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 39 ไร่

8. ศัตรูยางพารา

พื้นที่ปลูกยางพารามีทั้งหมด 68 จังหวัด จำนวน 18,381,778 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

8.1 โรครากขาว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 2,259 ไร่

8.2 โรคใบร่วง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 2,829 ไร่

8.3 โรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 383,379 ไร่

8.4 โรคหนำยางแห้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 6,683 ไร่

8.5 โรคราแป้ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 760 ไร่

8.6 โรคเส้นดำ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 161 ไร่

9. กาแฟ

พื้นที่ปลูกกาแฟมีทั้งหมด 60 จังหวัด จำนวน 100,612 ไร่ พบการระบาดของหนอนกาแฟสีแดง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 7 ไร่

10. ศัตรูทุเรียน

พื้นที่ปลูกทุเรียนมีทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 1,346,635 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

10.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 408 ไร่

10.2 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 996 ไร่

10.3 โรครากเน่าโคนเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 4,629 ไร่

10.4 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,016 ไร่

10.5 เพลี้ยหอยเกล็ด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 231 ไร่

10.6 เพลี้ยจักจั่นฝอย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 993 ไร่

10.7 หนอนเจาะผล มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 83 ไร่

10.8 โรคใบติดหรือใบไหม้ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 601 ไร่

- 10.9 โรคไรแดง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 849 ไร่
- 10.10 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 131 ไร่
- 10.11 โรคราสีชมพู มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 181 ไร่
- 10.12 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,185 ไร่
- 10.13 หนอนเจาะเมล็ด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 540 ไร่
- 10.14 มอดเจาะลำต้นทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 140 ไร่
- 10.15 โรคผลเน่าทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 21 ไร่
- 10.16 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 453 ไร่
- 10.17 โรคกิ่งแห้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 494 ไร่
- 10.18 โรคแอนแทรคโนส มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 427 ไร่

11. ศัตรูลำไย

พื้นที่ปลูกลำไยมีทั้งหมด 75 จังหวัด จำนวน 1,208,260 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 11.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 79 ไร่
- 11.2 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 269 ไร่
- 11.3 โรคพุ่มไม้กวาด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 196 ไร่
- 11.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 25 ไร่
- 11.5 ไรกำมะหยี่ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 38 ไร่
- 11.6 หนอนม้วนใบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 41 ไร่
- 11.7 มวนลำไย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 14 ไร่

12. ศัตรูมังคุด

พื้นที่ปลูกมังคุดมีทั้งหมด 65 จังหวัด จำนวน 304,587 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 12.1 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 152 ไร่
- 12.2 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 451 ไร่
- 12.3 หนอนซอนใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 349 ไร่
- 12.4 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 280 ไร่
- 12.5 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 576 ไร่

13. ศัตรูเงาะ

พื้นที่ปลูกเงาะมีทั้งหมด 71 จังหวัด จำนวน 138,688 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 13.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 55 ไร่
 - 13.2 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 295 ไร่
 - 13.3 โรคราแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 143 ไร่
 - 13.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 189 ไร่
-

แหล่งข้อมูล

- ส่วนอุตุนิยมหาวิทยาลัยเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์