



กรมอุตุนิยมวิทยา

๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 SUKHUMVIT ROAD, BANGKOK 10260, THAILAND

รายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตร

มิถุนายน 2568

Agrometeorological Report

June 2025

รายงานอากาศเลขที่ ๕๕๑.๕๘๖-๑๙-๒๕๖๘

Weather Report No. 551.586-19-2025

รายงานอตุณียมวิทยาเกษตร

มิถุนายน 2568

ส่วนอตุณียมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอตุณียมวิทยา

กรมอตุณียมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำนำ

วิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นอกจากต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพของลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศที่มีผลต่อการเกษตร ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา นับเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญต่อการค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางการเกษตร ตลอดจนการคาดหมายสภาพอากาศข้างหน้า ซึ่งมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินกิจการทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การให้น้ำ และการพ่นยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำรายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตรรายเดือน โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเชิงวิเคราะห์ การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และรายงานการระบาดของศัตรูพืช ให้แก่นักอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบ และใช้ค้นคว้าประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านการเกษตร การประมง การบริหารจัดการน้ำ และด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำ

กรกฎาคม 2568

สารบัญ

	หน้า
1. สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย เดือนมิถุนายน 2568	1
2. การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนมิถุนายน 2568	3
3. รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนมิถุนายน 2568	14
4. แหล่งข้อมูล	18

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนมิถุนายน 2568	6
--	---

สารบัญรูป

รูปที่ 1 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568	3
รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568	4
รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568	5
รูปที่ 4 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนมิถุนายน 2568	7
รูปที่ 5 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนมิถุนายน 2568	8
รูปที่ 6 แผนที่แสดงอุณหภูมิเฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2568	9
รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2568	10
รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2568	11
รูปที่ 9 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนมิถุนายน 2568	12
รูปที่ 10 แผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2568	13

สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย

เดือนมิถุนายน 2568

สภาวะอากาศโดยทั่วไปในระยะครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย โดยมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นช่วงๆ ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในระยะครึ่งหลังของเดือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลง และร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนตอนใต้ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกในระยะครึ่งแรกของเดือน ส่วนในระยะครึ่งหลังของเดือนปริมาณและการกระจายของฝนลดลง

สำหรับสภาวะอากาศเดือนมิถุนายนปีนี้ ประเทศไทยมีฝนตกเกือบตลอดเดือนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงตลอดเดือน ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นช่วงๆ โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนเกือบตลอดเดือน ในเดือนนี้มีปริมาณและการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ ทำให้ปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ร้อยละ 1 โดยอุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค โดยเฉลี่ยทั้งประเทศมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ 0.1 องศาเซลเซียส รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

วันที่ 1-10 มิถุนายน 2568 : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในระยะครึ่งหลังของช่วง ประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันสุดท้ายของช่วง โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนตลอดช่วง ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ 10-60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันสุดท้ายของช่วงมีฝนตกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคกลางมีฝนร้อยละ 10-40 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง ในขณะที่ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ 30-80 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 168.6 มิลลิเมตร ที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568 และมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2568 กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2568 สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของภาคมีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในระยะกลางและปลายช่วง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 149.7 มิลลิเมตร ที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568 กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดพัทลุง ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2568 จังหวัดสงขลา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2568 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 9 มิถุนายน 2568

วันที่ 11-20 มิถุนายน 2568 : ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะต้นช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ตลอดช่วง ทำให้ภาคเหนือมีฝนตกหนาแน่นร้อยละ 35-85 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ในระยะต้นและปลายช่วง กับมีฝนตกหนัก

ถึงหนักมากบางแห่งทางตอนบนของภาค ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ 45-80 ของพื้นที่ เกือบตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 207.1 มิลลิเมตร ที่อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดขอนแก่น เลย และมหาสารคาม ในวันที่ 11 มิถุนายน 2568 จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2568 กับมีรายงานน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2568 จังหวัดเชียงรายและหนองคาย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2568 นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดหนองคาย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2568 จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2568 สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกของภาคมีฝนร้อยละ 30-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งเกือบตลอดช่วง ส่วนฝั่งตะวันตกของภาคมีฝนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ เว้นแต่ในช่วงวันที่ 12-17 มิถุนายน 2568 มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 10-50 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุด 142.9 มิลลิเมตร ที่นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568


วันที่ 21-30 มิถุนายน 2568 : มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยตลอดช่วง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน เกือบตลอดช่วง โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนตลอดช่วง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดช่วง อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 40-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่กับหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนวัดได้ 280.5 มิลลิเมตร ที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2568 และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 22 มิถุนายน 2568 จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 23 และ 27 มิถุนายน 2568 จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2568 จังหวัดน่านและอุดรธานี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2568 โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2568 สำหรับภาคใต้มีร้อยละ 50-90 ของพื้นที่ ส่วนมากในระยะครึ่งแรกของช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 77.9 มิลลิเมตร ที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2568 โดยรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสตูล ในวันที่ 23 และ 24 มิถุนายน 2568 กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดยะลาและสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2568 จังหวัดพัทลุง ในวันที่ 23 และ 24 มิถุนายน 2568 จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 24 มิถุนายน 2568

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค อุณหภูมิสูงที่สุด 39.5 องศาเซลเซียส ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2568 สำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุด 20.8 องศาเซลเซียส ที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568

ปริมาณฝนเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 26.0 มิลลิเมตร (17%) ภาคกลาง 55.9 มิลลิเมตร (37%) ภาคตะวันออก 13.0 มิลลิเมตร (5%) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 0.8 มิลลิเมตร (1%) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 81.7 มิลลิเมตร (24%) มีเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ 40.4 มิลลิเมตร (21%)


หมายเหตุ : ข้อมูลฝน อุณหภูมิ และภัยธรรมชาติ เป็นรายงานเบื้องต้น

การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนมิถุนายน 2568




รูปที่ 1 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2568

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2568 จากการพิจารณาดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่



รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2568 จากการพิจารณาดรรชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่




รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568


ในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จากการพิจารณาดรรชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนมิถุนายน 2568


ภาค	สถานี	ปริมาณฝน	จำนวนวัน	อุณหภูมิ (°ซ.)			ความชื้น	ปริมาณน้ำ
		(มม.)	ฝนตก (วัน)	เฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	สัมพัทธ์ (%)	
เหนือ	เชียงใหม่	159.8	18	27.6	32.3	23.9	81.1	3.3
	ลำปาง	193.0	17	27.6	33.0	24.5	83.7	4.1
	น่าน	118.2	9	28.5	32.9	25.5	77.4	4.0
	ศรีสะเกษ	192.7	13	29.1	33.9	26.2	80.7	4.4
	ดอยมูเซอร์	197.3	26	22.7	25.8	20.5	88.8	3.6
	พิจิตร	117.7	15	29.4	34.2	25.9	79.9	4.7
ตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	111.1	18	27.6	33.6	24.4	85.2	3.5
	สกลนคร	466.5	21	28.1	32.9	25.1	83.7	3.4
	นครพนม	325.5	25	27.4	32.2	23.5	89.7	4.0
	ท่าพระ	267.1	16	28.8	34.0	24.2	81.0	4.8
	ร้อยเอ็ด	215.7	11	29.0	32.9	25.7	80.9	5.0
	อุบลราชธานี	239.0	20	28.2	33.1	24.4	82.0	3.7
	ศรีสะเกษ	105.5	14	28.7	33.1	25.7	80.7	4.0
	ปากช่อง	94.2	12	27.5	31.8	24.2	75.0	6.1
	สุรินทร์	229.2	12	28.5	33.7	25.1	81.7	4.2
	ตากฟ้า	51.5	10	29.0	34.3	24.8	78.1	4.8
กลาง	ชัยนาท	78.6	11	29.1	33.9	25.7	79.7	4.7
	อยุธยา	62.9	11	29.9	35.5	24.5	75.2	5.3
	ปทุมธานี	53.9	10	30.4	35.4	26.8	72.3	5.0
	ราชบุรี	42.3	12	29.0	34.3	25.6	76.0	3.8
	อุทัย	26.2	13	29.7	35.2	25.7	71.4	5.4
	กำแพงแสน	10.0	13	29.5	34.9	25.7	77.3	4.7
	บางนา	123.4	12	30.0	34.2	27.2	72.6	4.8
	ฉะเชิงเทรา	102.7	16	28.4	33.8	25.4	81.8	3.7
ตะวันออก	ห้วยโป่ง	35.6	9	29.3	33.6	26.4	81.2	4.1
	พลับ	416.6	25	28.1	31.6	25.0	87.0	3.2
	หนองพลับ	31.0	13	28.3	33.7	24.3	78.5	3.8
ใต้	สวี	190.3	21	27.6	32.7	24.8	85.0	3.6
	สุราษฎร์ธานี	126.4	17	27.9	33.6	24.5	82.8	4.1
	นครศรีธรรมราช	137.0	19	28.0	33.7	24.8	84.7	3.6
	พัทลุง	105.3	19	28.2	33.5	24.9	82.6	3.9
	คลองส	123.4	12	28.6	33.7	24.8	79.0	4.4
	ยะลา	140.7	17	27.8	33.9	24.0	81.9	3.8
หมายเหตุ T หมายถึง ฝนเล็กน้อยวัดปริมาณไม่ได้								




รูปที่ 4 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนมิถุนายน 2568




รูปที่ 5 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนมิถุนายน 2568




รูปที่ 6 แผนที่แสดงอุนหภูมิเฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2568




รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2568



รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2568



รูปที่ 9 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนมิถุนายน 2568



รูปที่ 10 แผนที่แสดงความขึ้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนมิถุนายน 2568

รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนมิถุนายน 2568

สำนักงานเกษตรจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2568 ดังนี้

1. ศัตรูข้าว

พื้นที่ปลูกข้าวมีทั้งหมด 73 จังหวัด จำนวน 32,916,646 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 1.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 65 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.2 เพลี้ยกระโดดหลังขาว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 6 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.3 หนอนห่อใบข้าว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 52 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.4 เพลี้ยไฟข้าว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 174 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.5 โรคไหม้ข้าว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 3,494 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน

2. ศัตรูมันสำปะหลัง

พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมีทั้งหมด 55 จังหวัด จำนวน 8,123,843 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 2.1 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,138 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังทุกช่วงอายุการปลูก
- 2.2 ไรแดง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 24,450 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-5 เดือน
- 2.3 โรคพุ่มแจ้ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 1,074 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน
- 2.4 โรคโคนเน่าหัวเน่า มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 125 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน
- 2.5 โรคใบด่างมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 864,679 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-5 เดือน
- 2.6 โรคใบไหม้ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 447 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-5 เดือน

3. ศัตรูอ้อย

พื้นที่ปลูกอ้อยมีทั้งหมด 47 จังหวัด จำนวน 4,711,418 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 3.1 โรคใบขาวอ้อย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 30,519 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุ 4-9 เดือน
- 3.2 หนอนกออ้อย มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 1,634 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุน้อยกว่า 4 เดือน
- 3.3 โรคเส้ดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 281 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุน้อยกว่า 4 เดือน
- 3.4 ดั๋งหนวดยาว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 167 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุ 4-9 เดือน

4. ศัตรูข้าวโพด

พื้นที่ปลูกข้าวโพดมีทั้งหมด 51 จังหวัด จำนวน 1,171,646 ไร่ พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 32 ไร่ ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อย

5. ศัตรูสับปะรด

พื้นที่ปลูกสับปะรดมีทั้งหมด 61 จังหวัด จำนวน 503,717 ไร่ พบการระบาดของโรคเหี่ยว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 311 ไร่

6. ศัตรูมะพร้าว

พื้นที่ปลูกมะพร้าวมีทั้งหมด 68 จังหวัด จำนวน 1,110,408 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 6.1 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 56,589 ไร่
ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง
- 6.2 แมลงดำหนาม มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 9,926 ไร่
ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง
- 6.3 ดั๋งแรด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 6,428 ไร่
- 6.4 ดั๋งวง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,133 ไร่
- 6.5 ไรสีขามะพร้าว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 827 ไร่

7. ศัตรูปาล์มน้ำมัน

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีทั้งหมด 67 จังหวัด จำนวน 5,410,692 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 7.1 ดั๋งแรด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,2063 ไร่
- 7.2 โรคลำต้นเน่า มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 11,749 ไร่
- 7.3 หนอนปลอกเล็ก มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 900 ไร่
- 7.4 โรคทะลายเน่า มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 938 ไร่
- 7.5 ดั๋งกุหลาบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 512 ไร่
- 7.6 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 89 ไร่

7.7 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 627 ไร่

7.8 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,123 ไร่

7.9 หนอนหน้าแมว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 210 ไร่

8. ศัตรูยางพารา

พื้นที่ปลูกยางพารามีทั้งหมด 67 จังหวัด จำนวน 18,213,024 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

8.1 โรคกลากขาว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,444 ไร่

8.2 โรคใบร่วง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,467 ไร่

8.3 โรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 9,860 ไร่

8.4 โรคหน้ำยางแห้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 4,787 ไร่

8.5 โรคราแป้ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 760 ไร่

8.6 โรคเส้นดำ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 135 ไร่

9. กาแฟ

พื้นที่ปลูกกาแฟมีทั้งหมด 60 จังหวัด จำนวน 95,233 ไร่ พบการระบาด หนอนกาแฟสีแดง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 7 ไร่

10. ศัตรูทุเรียน

พื้นที่ปลูกทุเรียนมีทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 1,298,119 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

10.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 363 ไร่

10.2 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 1,069 ไร่

10.3 โรคกลากเน่าโคนเน่า มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 4,167 ไร่

10.4 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 933 ไร่

10.5 เพลี้ยหอยเกล็ด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 209 ไร่

10.6 เพลี้ยจักจั่นฝอย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 994 ไร่

10.7 หนอนเจาะผล มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 175 ไร่

10.8 โรคใบติดหรือใบไหม้ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 534 ไร่

10.9 โรคโรแดง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 976 ไร่

10.10 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 96 ไร่

10.11 โรคราสีชมพู มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 193 ไร่

10.12 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,208 ไร่

10.13 หนอนเจาะเมล็ด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 68 ไร่

10.14 มอดเจาะลำต้นทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 101 ไร่

10.15 โรคผลเน่าทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 162 ไร่

10.16 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 249 ไร่

10.17 โรคกิ่งแห้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 669 ไร่

10.18 โรคแอนแทรกซิส มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 439 ไร่

11. ศัตรูลำไย

พื้นที่ปลูกลำไยมีทั้งหมด 76 จังหวัด จำนวน 1,127,872 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 11.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 82 ไร่
- 11.2 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 272 ไร่
- 11.3 โรคพุ่มไม้กวาด มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 153 ไร่
- 11.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 24 ไร่
- 11.5 ไรกำมะหยี่ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 50 ไร่
- 11.6 หนอนม้วนใบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 41 ไร่
- 11.7 มวนลำไย มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 15 ไร่

12. ศัตรูมังคุด

พื้นที่ปลูกมังคุดมีทั้งหมด 72 จังหวัด จำนวน 295,153 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 12.1 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 148 ไร่
- 12.2 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 439 ไร่
- 12.3 หนอนชอนใบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 328 ไร่
- 12.4 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 263 ไร่
- 12.5 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 558 ไร่

13. ศัตรูเงาะ

พื้นที่ปลูกเงาะมีทั้งหมด 72 จังหวัด จำนวน 138,172 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 13.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 46 ไร่
 - 13.2 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 280 ไร่
 - 13.3 โรคราแป้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 135 ไร่
 - 13.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 159 ไร่
-

แหล่งข้อมูล

- ส่วนอุตุนิยมหาวิทยาลัยเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์