



กรมอุตุนิยมวิทยา

๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 SUKHUMVIT ROAD, BANGKOK 10260, THAILAND

รายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตร

เมษายน 2568

Agrometeorological Report

April 2025

รายงานอากาศเลขที่ ๕๕๑.๕๘๖-๑๗-๒๕๖๘

Weather Report No. 551.586-17-2025

รายงานอตุณียมวิทยาเกษตร

เมษายน 2568

ส่วนอตุณียมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอตุณียมวิทยา

กรมอตุณียมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำนำ

วิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นอกจากต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพของลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศที่มีผลต่อการเกษตร ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา นับเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญต่อการค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางการเกษตร ตลอดจนการคาดหมายสภาพอากาศข้างหน้า ซึ่งมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินกิจการทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การให้น้ำ และการพ่นยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำรายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตรรายเดือน โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเชิงวิเคราะห์ การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และรายงานการระบาดของศัตรูพืช ให้แก่นักอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบ และใช้ค้นคว้าประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านการเกษตร การประมง การบริหารจัดการน้ำ และด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำ

พฤษภาคม 2568

สารบัญ

	หน้า
1. สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย เดือนเมษายน 2568	1
2. การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนเมษายน 2568	4
3. รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนเมษายน 2568	15
4. แหล่งข้อมูล	19

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนเมษายน 2568	7
--	---

สารบัญรูป

รูปที่ 1 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568	4
รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2568	5
รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568	6
รูปที่ 4 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนเมษายน 2568	8
รูปที่ 5 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนเมษายน 2568	9
รูปที่ 6 แผนที่แสดงอุณหภูมิเฉลี่ย เดือนเมษายน 2568	10
รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนเมษายน 2568	11
รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนเมษายน 2568	12
รูปที่ 9 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนเมษายน 2568	13
รูปที่ 10 แผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนเมษายน 2568	14

สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย

เดือนเมษายน 2568

สภาวะอากาศทั่วไปเดือนเมษายนอยู่ในช่วงฤดูร้อน หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนรวมทั้งคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นช่วงๆ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนเกิดพายุฤดูร้อนเป็นบางครั้ง โดยมีอากาศร้อนอบอ้าวและมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ กับมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง

สำหรับสภาวะอากาศเดือนเมษายนปีนี้ หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ กับมีลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดเดือน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในบางช่วง ประกอบกับในระยะปลายเดือนมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเป็นช่วงๆ กับมีรายงานลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ สำหรับภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมเกือบตลอดเดือน กับมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงต้นเดือน ทำให้มีฝนตกเกือบตลอดเดือน โดยเดือนนี้ปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค ส่งผลให้ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติ 21.3 มิลลิเมตร (ร้อยละ 32) รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

วันที่ 1-10 เมษายน 2568 : บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ได้อ่อนกำลังลงในระยะกลางช่วง จากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวเกือบตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคกลาง อุณหภูมิสูงสุด 41.5 องศาเซลเซียส ที่ อำเภอยะบะดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2568 สำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนส่วนมากในระยะครึ่งหลังของช่วงกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดของประเทศไทยตอนบนวัดได้ 140.0 มิลลิเมตร ที่ อำเภอกะชัง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 นอกจากนี้มีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวลำภู มหาสารคาม ชัยภูมิ อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ลพบุรี นครสวรรค์ ปทุมธานี และสิงห์บุรี กับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568 และจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ ทำให้มีฝนตกหนาแน่นส่วนมากในระยะต้นและปลายช่วง โดยมีฝนอยู่ใน

เกณฑ์ร้อยละ 40-90 ของพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 136.0 มิลลิเมตร ที่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568

วันที่ 11-20 เมษายน 2568 : ในระยะครึ่งแรกของช่วงบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนอบอ้าว จากนั้นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะปลายช่วง ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวเกือบตลอดช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วง กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคกลางในระยะปลายช่วง อุณหภูมิสูงสุด 40.6 องศาเซลเซียส ที่ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2568 สำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนร้อยละ 40-90 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดของประเทศไทยตอนบนวัดได้ 150.2 มิลลิเมตร ที่ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 นอกจากนี้ในระยะครึ่งหลังของช่วงมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตาก ลำปาง เชียงราย กำแพงเพชร เชียงใหม่ พะเยา เพชรบูรณ์ อุตรธานี เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม หนองบัวลำภู โยโสธร สกลนคร อำนาจเจริญ นครพนม สุนทรบุรี เลย กาฬสินธุ์ หนองคาย อุบลราชธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี และปทุมธานี ส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ทำให้มีฝนตกหนาแน่นร้อยละ 50-90 ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 107.7 มิลลิเมตร ที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2568 และมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2568

วันที่ 21-30 เมษายน 2568 : ในระยะครึ่งแรกของช่วงหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน กับมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ส่วนในระยะครึ่งหลังของช่วงบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ เว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอากาศร้อนทางตอนบนของภาค อุณหภูมิสูงสุด 42.3 องศาเซลเซียส ที่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2568 สำหรับในช่วงนี้มีฝนบางแห่งในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 35-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดของประเทศไทยตอนบนวัดได้ 166.5 มิลลิเมตร ที่ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ เชียงราย น่าน พิษณุโลก ลำปาง พะเยา นครพนม สกลนคร เลย อำนาจเจริญ ชัยภูมิ โยโสธร กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี อุตรธานี หนองคาย สุนทรบุรี มหาสารคาม ขอนแก่น นครราชสีมา นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ปทุมธานี และปราจีนบุรี ส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมตลอดช่วง ทำให้มีฝนตกหนาแน่นร้อยละ 45-90 ของพื้นที่ ส่วนมากในระยะต้นและกลางช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 132.2 มิลลิเมตร ที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568


จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2568 จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2568 กับมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค เว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าค่าปกติ 0.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำที่สุด 16.5 องศาเซลเซียส ที่ กลุ่มงานอากาศเกษตร จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 และอุณหภูมิสูงที่สุด 42.3 องศาเซลเซียส ที่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2568

ปริมาณฝนเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติเกือบทุกภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 37.2 มิลลิเมตร (53%) ภาคกลาง 33.9 มิลลิเมตร (44%) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 41.4 มิลลิเมตร (52%) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 58.8 มิลลิเมตร (36%) เว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติ 21.6 มิลลิเมตร (25%) และ 0.4 มิลลิเมตร (0%) ตามลำดับ


หมายเหตุ : ข้อมูลฝน อุณหภูมิ และภัยธรรมชาติ เป็นรายงานเบื้องต้น

การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนเมษายน 2568




รูปที่ 1 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568

ในวันที่ 10 เมษายน 2568 จากการพิจารณาดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่



รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2568

ในวันที่ 20 เมษายน 2568 จากการพิจารณาดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่




รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

ในวันที่ 30 เมษายน 2568 จากการพิจารณาดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่


ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุณิยมิวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนเมษายน 2568

ภาค	สถานี	ปริมาณฝน	จำนวนวัน	อุณหภูมิ (°ซ.)			ความชื้น	ปริมาณน้ำ
		(มม.)	ฝนตก (วัน)	เฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	สัมพัทธ์ (%)	ระเหย (มม./วัน)
เหนือ	เชียงใหม่	51.6	8	28.0	34.6	22.6	69.0	4.2
	ลำปาง	99.6	14	28.6	36.4	23.5	68.9	5.4
	น่าน	75.7	7	29.1	36.0	24.0	68.2	4.2
	ศรีสะเกษ	132.2	7	30.3	36.3	25.8	71.6	4.7
	คอยมูเซอร์	168.8	14	23.7	29.0	20.2	79.6	4.5
	พิจิตร	22.1	5	30.9	37.4	25.8	67.3	6.0
ตะวันออกเฉียงเหนือ	เลย	125.4	12	27.6	35.4	22.9	75.3	4.6
	สกลนคร	118.3	9	28.4	36.1	23.0	68.1	5.4
	นครพนม	65.1	8	28.3	35.2	22.8	69.3	5.1
	ตาก	36.4	10	29.8	36.9	24.0	78.2	5.3
	ร้อยเอ็ด	69.6	8	29.6	36.1	24.3	66.8	6.1
กลาง	อุบลราชธานี	28.2	3	29.9	37.8	23.5	63.2	6.2
	ศรีสะเกษ	34.9	7	30.3	37.1	24.8	63.8	5.8
	ปากช่อง	113.5	13	27.7	34.1	23.2	72.9	6.1
	สุรินทร์	38.6	5	30.0	37.3	24.5	67.4	5.0
ตะวันออก	ตากฟ้า	171.4	7	30.7	37.1	25.5	66.5	6.9
	ชัยนาท	59.9	7	30.5	36.6	25.8	73.7	6.3
	อยุธยา	38.5	8	30.7	37.3	25.2	71.3	5.4
	ปทุมธานี	89.6	10	30.9	37.1	26.5	72.6	5.2
	ราชบุรี	8.1	4	30.1	36.3	25.5	71.4	5.6
	อุททอง	59.0	6	30.4	36.9	25.3	70.5	5.8
	กำแพงแสน	32.6	5	30.5	36.7	25.5	74.8	5.2
ใต้	บางนา	66.1	6	30.9	35.6	26.9	71.4	5.3
ใต้	ฉะเชิงเทรา	136.5	15	28.5	35.7	24.8	80.7	3.8
	หัวยโป้ง	94.0	11	29.3	33.3	26.4	80.5	4.2
	พลั่ว	149.9	13	28.6	33.0	25.4	82.1	3.5
ใต้	หนองพลับ	56.7	9	28.3	34.9	23.5	78.5	4.4
	สวี	239.9	12	28.1	33.7	24.5	84.4	4.1
	สุราษฎร์ธานี	165.0	15	28.0	34.3	24.1	82.6	4.6
	นครศรีธรรมราช	304.3	19	28.2	33.6	24.6	87.4	3.9
	พัทลุง	137.9	17	28.4	33.1	25.3	84.5	4.3
	คอหงส์	144.4	13	28.6	33.7	24.7	78.8	4.4
	ยะลา	104.7	15	28.1	34.1	23.9	81.3	4.2


หมายเหตุ T หมายถึง ฝนเล็กน้อยวัดปริมาณไม่ได้




รูปที่ 4 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนเมษายน 2568




รูปที่ 5 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนเมษายน 2568




รูปที่ 6 แผนที่แสดงอุณหภูมิเฉลี่ย เดือนเมษายน 2568




รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนเมษายน 2568



รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนเมษายน 2568



รูปที่ 9 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนเมษายน 2568



รูปที่ 10 แผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนเมษายน 2568

รายงานสถานการณ์ศัตรูพืชระบาด เดือนเมษายน 2568

สำนักงานเกษตรจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจเดือนเมษายน 2568 ดังนี้

1. ศัตรูข้าว

พื้นที่ปลูกข้าวมีทั้งหมด 73 จังหวัด จำนวน 25,148,180 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 1.1 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 329 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.2 เพลี้ยกระโดดหลังขาว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 15 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุ 40-60 วัน
- 1.3 หนอนห่อใบข้าว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 33 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน
- 1.4 แมลงบั่ว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 220 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในข้าวอายุมากกว่า 60 วัน

2. ศัตรูมันสำปะหลัง

พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมีทั้งหมด 54 จังหวัด จำนวน 7,468,760 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 2.1 เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 2,138 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน
- 2.2 ไรแดง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 19,096 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุน้อยกว่า 3 เดือน
- 2.3 โรคพุ่มแจ้ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,153 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน
- 2.4 โรคโคนเน่าหัวเน่า มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 114 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน
- 2.5 โรคใบด่างมันสำปะหลัง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 797,928 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุ 3-8 เดือน
- 2.6 โรคใบไหม้ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 20 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในมันสำปะหลังอายุมากกว่า 8 เดือน

3. ศัตรูอ้อย

พื้นที่ปลูกอ้อยมีทั้งหมด 46 จังหวัด จำนวน 4,252,169 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 3.1 โรคใบขาวอ้อย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 561 ไร่
การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุน้อยกว่า 9 เดือน

3.2 หนอนกออ้อย มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 2,989 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุน้อยกว่า 4 เดือน

3.3 โรคเส้ดำ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 646 ไร่

การระบาดส่วนใหญ่พบในอ้อยอายุน้อยกว่า 4 เดือน

4. ศัตรูข้าวโพด

พื้นที่ปลูกข้าวโพดมีทั้งหมด 55 จังหวัด จำนวน 1,008,186 ไร่ พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 27 ไร่ ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อย

5. ศัตรูสับปะรด

พื้นที่ปลูกสับปะรดมีทั้งหมด 61 จังหวัด จำนวน 499,228 ไร่ พบการระบาดของโรคเหี่ยว มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 343 ไร่

6. ศัตรูมะพร้าว

พื้นที่ปลูกมะพร้าวมีทั้งหมด 68 จังหวัด จำนวน 1,122,779 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

6.1 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 61,344 ไร่

ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงปานกลาง

6.2 แมลงดำหนาม มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 12,750 ไร่

ส่วนใหญ่พบการระบาดแบบรุนแรงน้อยถึงปานกลาง

6.3 ตัวแรด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 6,447 ไร่

6.4 ตัวงวง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,157 ไร่

6.5 ไรสีขา มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 839 ไร่

7. ศัตรูปาล์มน้ำมัน

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมีทั้งหมด 67 จังหวัด จำนวน 5,266,497 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

7.1 ตัวแรด มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,239 ไร่

7.2 โรคลำต้นเน่า มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 11,838 ไร่

7.3 หนอนปลอกเล็ก มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 669 ไร่

7.4 โรคทะลายเน่า มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 933 ไร่

7.5 ตัวงูหาลาบ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 506 ไร่

7.6 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 88 ไร่

7.7 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 281 ไร่

7.8 หนอนหัวดำ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 706 ไร่

7.9 หนอนหน้าแมว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 612 ไร่

8. ศัตรูยางพารา

พื้นที่ปลูกยางพารามีทั้งหมด 67 จังหวัด จำนวน 18,110,900 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 8.1 โรคกลากขาว มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,426 ไร่
- 8.2 โรคใบร่วง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,474 ไร่
- 8.3 โรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 395,689 ไร่
- 8.4 โรคหน้ำยางแห้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 4,732 ไร่

9. กาแฟ

พื้นที่ปลูกกาแฟมีทั้งหมด 60 จังหวัด จำนวน 97,285 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 9.1 หนอนกาแฟสีแดง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 8 ไร่
- 9.2 ตัวหนอนดียวาว มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 370 ไร่

10. ศัตรูทุเรียน

พื้นที่ปลูกทุเรียนมีทั้งหมด 77 จังหวัด จำนวน 1,274,501 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 10.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 324 ไร่
- 10.2 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,094 ไร่
- 10.3 โรคกลากเน่าโคนเน่า มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 3,782 ไร่
- 10.4 เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 902 ไร่
- 10.5 เพลี้ยหอยเกล็ด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 190 ไร่
- 10.6 เพลี้ยจักจั่นฝอย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 876 ไร่
- 10.7 หนอนเจาะผล มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 87 ไร่
- 10.8 โรคใบติดหรือใบไหม้ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 337 ไร่
- 10.9 โรคไรแดง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 1,095 ไร่
- 10.10 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 53 ไร่
- 10.11 โรคราสีชมพู มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 262 ไร่
- 10.12 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 1,079 ไร่
- 10.13 หนอนเจาะเมล็ด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 5 ไร่
- 10.14 มอดเจาะลำต้นทุเรียน มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 90 ไร่
- 10.15 ตัวหนอนดียวาวเจาะลำต้น มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 9 ไร่
- 10.16 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 216 ไร่
- 10.17 โรคกิ่งแห้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 314 ไร่
- 10.18 โรคแอนแทรคโนส มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 390 ไร่

11. ศัตรูมังคุด

พื้นที่ปลูกมังคุดมีทั้งหมด 72 จังหวัด จำนวน 305,198 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 11.1 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 194 ไร่

- 11.2 หนอนกินใบ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 407 ไร่
- 11.3 หนอนซอนใบ มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 324 ไร่
- 11.4 โรคใบจุด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 236 ไร่
- 11.5 โรคแอนแทรคโนส มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 40 ไร่
- 11.6 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 505 ไร่
- 11.7 โรคใบแห้งและขอบใบแห้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 34 ไร่
- 11.8 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 17 ไร่
- 11.9 ไรแดง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 20 ไร่

12. ศัตรูเงาะ

พื้นที่ปลูกเงาะมีทั้งหมด 72 จังหวัด จำนวน 137,704 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 12.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 42 ไร่
- 12.2 โรคใบจุดสาหร่าย มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 248 ไร่
- 12.3 โรคราแป้ง มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 66 ไร่
- 12.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 146 ไร่
- 12.5 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 9 ไร่
- 12.6 หนอนกินช่อดอก มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 12 ไร่
- 12.7 โรคขอบใบแห้ง มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 6 ไร่

13. ศัตรูลำไย

พื้นที่ปลูกลำไยมีทั้งหมด 76 จังหวัด จำนวน 1,123,457 ไร่ พบการระบาด ดังนี้

- 13.1 เพลี้ยแป้ง มีแนวโน้มการระบาดลดลง โดยพบการระบาด 85 ไร่
 - 13.2 โรคราดำ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 267 ไร่
 - 13.3 โรคพุ่มไม้กวาด มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 162 ไร่
 - 13.4 หนอนคืบกินใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 26 ไร่
 - 13.5 ไรกำมะหยี่ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 50 ไร่
 - 13.6 หนอนม้วนใบ มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยพบการระบาด 41 ไร่
 - 13.7 หนอนเจาะกิ่งและลำต้น มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 5 ไร่
 - 13.8 มวนลำไย มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 15 ไร่
 - 13.9 เพลี้ยไฟ มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 16 ไร่
 - 13.10 หนอนกินดอกลำไย มีแนวโน้มการระบาดคงที่ โดยพบการระบาด 19 ไร่
-

แหล่งข้อมูล

- ส่วนอุตุนิยมหาวิทยาลัยเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์