



กรมอุตุนิยมวิทยา

๔๓๕๓ ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 SUKHUMVIT ROAD, BANGKOK 10260, THAILAND

รายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตร

สิงหาคม 2569

Agrometeorological Report

August 2026

รายงานอากาศเลขที่ ๕๕๑.๕๘๖-๐๙-๒๕๖๙

Weather Report No. 551.586-09-2026

รายงานอตุณียมวิทยาเกษตร

สิงหาคม 2569

ส่วนอตุณียมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอตุณียมวิทยา

กรมอตุณียมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คำนำ

วิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นอกจากต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว ยังจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพของลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศที่มีผลต่อการเกษตร ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา นับเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญต่อการค้นคว้าทดลองหรือวิจัยทางการเกษตร ตลอดจนการคาดหมายสภาพอากาศข้างหน้า ซึ่งมีความสำคัญต่อการประยุกต์ใช้ในการวางแผนและดำเนินกิจการทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การให้น้ำ และการพ่นยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น

ส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ได้จัดทำรายงานอุตุนิยมวิทยาเกษตรรายเดือน โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเชิงวิเคราะห์ การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และรายงานการระบาดของศัตรูพืช ให้แก่นักอุตุนิยมวิทยา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรกร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบ และใช้ค้นคว้าประกอบการวางแผนพัฒนางานด้านการเกษตร การประมง การบริหารจัดการน้ำ และด้านอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำ

กันยายน 2569

สารบัญ

	หน้า
1. สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย เดือนสิงหาคม 2569	1
2. การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนสิงหาคม 2569	4
3. สรุปสถานการณ์โรคพืชในประเทศไทย เดือนสิงหาคม 2569	15
4. แหล่งข้อมูล	18

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนสิงหาคม 2569	7
---	---

สารบัญรูป


รูปที่ 1 แผนที่แสดงเส้นทางเดินพายุโซนร้อน “นาร์รา (NARRA, 2619)”	1
รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569	4
รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569	5
รูปที่ 4 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2569	6
รูปที่ 5 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนสิงหาคม 2569	8
รูปที่ 6 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนสิงหาคม 2569	9
รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุณหภูมิเฉลี่ย เดือนสิงหาคม 2569	10
รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนสิงหาคม 2569	11
รูปที่ 9 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนสิงหาคม 2569	12
รูปที่ 10 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนสิงหาคม 2569	13
รูปที่ 11 แผนที่แสดงความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนสิงหาคม 2569	14

สรุปสภาวะอากาศประเทศไทย

เดือนสิงหาคม 2569

สภาวะอากาศโดยทั่วไปเดือนสิงหาคม ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย โดยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

สำหรับสภาวะอากาศสิงหาคมปีนี้ ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบนเป็นส่วนใหญ่ และในบางช่วงได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีปริมาณและการกระจายของฝนไม่สม่ำเสมอ และพื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติ แต่ในบางช่วงบริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในบางช่วง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและเกาะไหหลำในช่วงวันที่ 19-20 สิงหาคม ซึ่งต่อมาได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “นาร์รา (NARRA, 2619)” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม และเคลื่อนตัวอยู่บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ก่อนจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของมณฑลกว่างตง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ทั้งนี้ในช่วงที่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณเกาะไหหลำทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มในบางพื้นที่ สำหรับภาคใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ ทำให้ภาคใต้มีฝนส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำกว่าค่าปกติทุกภาค โดยต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ 17 ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ 0.4 องศาเซลเซียส รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้



รูปที่ 1 แผนที่แสดงเส้นทางเดินพายุโซนร้อน “นาร์รา (NARRA, 2619)”

วันที่ 1-10 สิงหาคม 2569 : ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ยเกือบตลอดช่วง และในบางช่วงได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย เกือบตลอดช่วง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ที่เกือบตลอดช่วง ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนส่วนมากในระยะกลางและปลายช่วงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 70-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 250.0 มิลลิเมตร ที่ อำเภอบ้านแพญ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 9 โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 10 กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 6 จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 8 จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 9 และจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน และลำปาง เมื่อวันที่ 10 กับมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 6 และดินถล่มบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 9 และจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สำหรับภาคใต้ปริมาณฝนส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของภาคอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ที่เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ 30-50 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 173.4 มิลลิเมตร ที่ นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 4

วันที่ 11-20 สิงหาคม 2569 : ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบน ในระยะต้นช่วง จากนั้นได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในระยะกลางช่วง ส่วนในระยะปลายช่วงร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและเกาะไหหลำ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย เกือบตลอดช่วง ทำให้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ เกือบตลอดช่วง โดยเฉพาะในระยะปลายช่วงมีฝนมากกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงบริเวณจังหวัดน่านในช่วงดังกล่าว สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ปริมาณฝนส่วนใหญ่อยู่ในระยะปลายช่วงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60-90 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 196.9 มิลลิเมตร ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหราชอาณาจักร กรุงเทพมหานคร อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18-20 จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 19-20 จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครพนม และสกลนคร เมื่อวันที่ 20 กับมีรายงานดินถล่มจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 12 และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 สำหรับภาคใต้มีฝนส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาคอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 60-90 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ 20-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ปริมาณฝนมากที่สุด 70.4 มิลลิเมตร ที่ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 20 และมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 14

วันที่ 21-31 สิงหาคม 2569 : ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนในระยะต้นช่วง โดยพาดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำ ซึ่งต่อมามีหย่อมความกดอากาศต่ำ


ดังกล่าวได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในช่วงบ่ายของวันที่ 21 และพัฒนาเป็นพายุโซนร้อน “นาร์รา (NARRA,2619)” ในช่วงเช้าของวันที่ 22 พายุลูกนี้แทบจะไม่เคลื่อนที่ โดยเคลื่อนตัวอยู่บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ก่อนจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกว่างตง ประเทศจีน ในช่วงเช้าของวันที่ 26 ก่อนอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน โดยร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนในระยะกลางช่วงตามการเคลื่อนตัวของพายุ และได้เลื่อนกลับลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในระยะปลายช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ตลอดช่วง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนมากในระยะต้นและปลายช่วง ปริมาณฝนมากที่สุดวัดได้ 163.9 มิลลิเมตร ที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 26 โดยมีรายงานลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 28 จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 29 และจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 30 กับมีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดอุดรดิตถ์ เมื่อวันที่ 21 จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 และจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 อีกทั้งมีรายงานน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 29 จังหวัดปราจีนบุรีและสระบุรี เมื่อวันที่ 30 และจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 31 กับมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 28 สำหรับภาคใต้ ทางฝั่งตะวันออกของภาคมีฝนส่วนมากทางตอนบนของภาคอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนทางฝั่งตะวันตกของภาคมีฝนร้อยละ 40-80 ของพื้นที่ เกือบตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักและฝนหนักมากบางพื้นที่ ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ 159.8 มิลลิเมตร ที่ อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 27

อุณหภูมิเฉลี่ยเดือนนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิใกล้เคียงค่าปกติเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ภาคใต้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ 0.4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38.2 องศาเซลเซียส ที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ เมื่อวันที่ 14 อุณหภูมิต่ำที่สุด 21.0 องศาเซลเซียส ที่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 21

ปริมาณฝนเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติทุกภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 3.9 มิลลิเมตร (ร้อยละ 2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17.7 มิลลิเมตร (ร้อยละ 7) ภาคกลาง 24.4 มิลลิเมตร (ร้อยละ 13) ภาคตะวันออก 56.2 มิลลิเมตร (ร้อยละ 20) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 49.7 มิลลิเมตร (ร้อยละ 39) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก 182.0 มิลลิเมตร (ร้อยละ 43)


-
- หมายเหตุ :
1. ข้อมูลฝน อุณหภูมิ และภัยธรรมชาติ เป็นรายงานเบื้องต้น
 2. นาร์รา (NARRA) หมายถึง ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง (ต้นประดู่) ตั้งโดยประเทศฟิลิปปินส์

การติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เดือนสิงหาคม 2569




รูปที่ 2 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2569 จากการพิจารณาดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ พื้นที่ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่



รูปที่ 3 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2569

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2569 จากการพิจารณาตรรกะดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่




รูปที่ 4 แผนที่แสดงดัชนีความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2569


ในวันที่ 30 สิงหาคม 2569 จากการพิจารณาตรรกะดัชนีความชื้นในดินของประเทศไทย ที่ระดับความลึก 30 ซม. และ 60 ซม. บริเวณพื้นที่สีแดงถึงส้มแสดงถึงบริเวณที่ดินสะสมความชื้นไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช อาจทำให้เกิดสภาวะแล้งทางการเกษตรอยู่ในภาคเหนือบางพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ ภาคกลางหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกบางพื้นที่ และภาคใต้บางพื้นที่ ส่วนบริเวณที่มีสีเหลืองถึงเขียวแสดงถึงบริเวณที่มีความชื้นในดินเพียงพอต่อความต้องการของพืชที่มีระบบรากลึกอยู่ในภาคเหนือหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ ภาคกลางบางพื้นที่ ภาคตะวันออกหลายพื้นที่ และภาคใต้หลายพื้นที่

ตารางที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตรของประเทศไทย เดือนสิงหาคม 2569


ภาค	สถานี	ปริมาณฝน	จำนวนวัน	อุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$)			ความชื้น	ปริมาณน้ำ
		(มม.)	ฝนตก (วัน)	เฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	สัมพัทธ์ (%)	ระเหย (มม./วัน)
เหนือ	เชียงใหม่	332.3	24	26.6	31.3	23.6	86.4	3.6
	ลำปาง	270.7	25	27.5	32.8	24.7	81.0	3.5
	น่าน	249.1	16	26.6	31.4	24.2	84.6	3.6
	ศรีสะเกษ	262.9	17	28.0	32.7	25.4	76.1	3.9
	ดอยมูเซอ	280.8	29	21.7	23.5	20.7	92.9	1.7
	พิจิตร	228.3	16	28.3	33.5	25.4	89.3	4.2
	เลย	95.4	18	27.6	32.8	24.7	87.5	2.8
	สกลนคร	284.0	20	28.1	32.3	25.4	87.0	3.6
	นครพนม	787.8	29	27.0	30.3	24.8	95.8	3.7
ตะวันออก	ท่าพระ	126.8	14	27.7	32.1	24.8	82.5	3.6
เฉียงเหนือ	ร้อยเอ็ด	241.6	17	27.7	31.1	25.2	87.8	4.2
	อุบลราชธานี	341.9	21	27.6	32.3	24.4	85.8	3.4
	ศรีสะเกษ	197.6	24	28.3	32.1	25.6	81.6	4.2
	ปากช่อง	236.9	21	26.9	30.5	24.3	78.7	4.7
	สุรินทร์	131.4	17	27.8	32.6	24.8	89.5	3.6
กลาง	ตากฟ้า	116.3	20	28.1	32.9	23.0	82.4	4.1
	ชัยนาท	131.0	22	28.2	33.4	25.3	79.5	3.7
	อยุธยา	225.3	14	28.9	34.0	25.9	86.1	4.0
	ปทุมธานี	147.2	16	29.5	34.6	26.4	75.8	5.8
	ราชบุรี	114.5	21	28.8	34.5	25.6	76.7	3.8
	อุทอง	97.6	18	28.9	33.7	25.5	79.2	4.5
	กำแพงแสน	83.4	24	29.0	34.2	25.7	82.3	4.0
	บางนา	60.7	19	29.9	34.0	27.5	67.0	4.3
ตะวันออก	ละโว้	121.7	24	28.0	33.3	25.1	84.1	3.9
	ห้วยโป่ง	74.4	20	28.3	32.4	25.7	83.8	4.2
	พลั่ว	175.9	23	28.3	31.9	25.8	89.4	3.1
ใต้	หนองพลับ	66.1	22	27.6	32.6	24.3	80.6	3.5
	สวี	178.3	26	28.4	33.5	25.7	86.2	2.9
	สุราษฎร์ธานี	60.4	13	28.7	34.5	25.1	77.5	4.8
	นครศรีธรรมราช	39.4	7	28.6	34.5	24.8	80.0	4.2
	พัทลุง	6.8	6	29.4	35.6	25.1	78.6	4.9
	คอหงส์	72.2	7	28.8	34.4	25.0	76.5	4.9
	ยะลา	129.1	11	28.6	35.6	24.4	82.1	4.2
หมายเหตุ T หมายถึง ฝนเล็กน้อยวัดปริมาณไม่ได้								




รูปที่ 5 แผนที่แสดงปริมาณฝน เดือนสิงหาคม 2569




รูปที่ 6 แผนที่แสดงจำนวนวันที่มีฝนตก เดือนสิงหาคม 2569




รูปที่ 7 แผนที่แสดงอุนทภูมิเฉลี่ย เดือนสิงหาคม 2569




รูปที่ 8 แผนที่แสดงอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนสิงหาคม 2569



รูปที่ 9 แผนที่แสดงอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย เดือนสิงหาคม 2569



รูปที่ 10 แผนที่แสดงปริมาณน้ำระเหย เดือนสิงหาคม 2569



รูปที่ 11 แผนที่แสดงการเพิ่มขึ้นสัมพัทธ์เฉลี่ย เดือนสิงหาคม 2569

สรุปสถานการณ์โรคพืชในประเทศไทย เดือนสิงหาคม 2569

โรค/ศัตรูพืช
69

จังหวัดที่พบการระบาด
69

 [ดาวน์โหลดสรุป Word](#)

พื้นที่ระบาดรวม (ไร่)
1,965,182

ภาพรวมทั้งประเทศ

กาแฟ

- **มอดเจาะผลกาแฟ** เพิ่มขึ้น 166 ไร่
พื้นที่ระบาดรวม: 919 ไร่ · จังหวัด: ดาก, น่าน, เชียงใหม่, เพชรบูรณ์, แม่ฮ่องสอน · 5 จังหวัด
- **หนอนเจาะกิ่ง/หนอนเจาะลำต้น** ลดลง 4 ไร่
พื้นที่ระบาดรวม: 161 ไร่ · จังหวัด: ดาก, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน · 3 จังหวัด
- **โรคใบจุดดาก** คงที่
พื้นที่ระบาดรวม: 135 ไร่ · จังหวัด: เชียงใหม่, เพชรบูรณ์ · 2 จังหวัด

ข้าว

- **หนอนดักกินราก** คงที่
พื้นที่ระบาดรวม: 105 ไร่ · จังหวัด: เพชรบูรณ์ · 1 จังหวัด
- **เพลี้ยกระโดดหลังขาว** เพิ่มขึ้น 1,210 ไร่
พื้นที่ระบาดรวม: 1,272 ไร่ · จังหวัด: ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน · 4 จังหวัด
- **โรคขอบใบแห้งข้าว** เพิ่มขึ้น 76 ไร่
พื้นที่ระบาดรวม: 211 ไร่ · จังหวัด: นนทบุรี, สกลนคร, สงขลา · 3 จังหวัด
- **โรคไหม้ข้าว** เพิ่มขึ้น 831 ไร่
พื้นที่ระบาดรวม: 1,695 ไร่ · จังหวัด: กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครพนม, นครราชสีมา, นนทบุรี, ปราจีนบุรี, Mukdahan, สกลนคร, สงขลา, สุรินทร์,หนองคาย, อุบลราชธานี, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน · 15 จังหวัด

ข้าวโพด

- **ของหนอนกระหู่ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm)** ลดลง 59 ไร่
พื้นที่ระบาดรวม: 2,555 ไร่ · จังหวัด: ขอนแก่น, จันทบุรี, ชลบุรี, นครราชสีมา, ยะลา, สตูล, อุตรดิตถ์, เชียงใหม่, เพชรบูรณ์ · 9 จังหวัด
- **หนอนแมลงวัน** คงที่
พื้นที่ระบาดรวม: 518 ไร่ · จังหวัด: นครสวรรค์, เพชรบูรณ์ · 2 จังหวัด
- **หนุ** เพิ่มขึ้น 13,367 ไร่
พื้นที่ระบาดรวม: 20,038 ไร่ · จังหวัด: ดาก · 1 จังหวัด

ทุเรียน

- **มอดเจาะลำต้นทุเรียน** คงที่
พื้นที่ระบาดรวม: 278 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, ชุมพร, ตราด, นราธิวาส, ยะลา, สงขลา, สุราษฎร์ธานี · 7 จังหวัด
- **หนอนกินใบ** คงที่
พื้นที่ระบาดรวม: 282 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, ชุมพร, ตราด, ระยอง, สุรินทร์ · 5 จังหวัด
- **หนอนเจาะผล** ลดลง 7 ไร่
พื้นที่ระบาดรวม: 133 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, ตรัง, นราธิวาส, พัทลุง, ยะลา, สงขลา, สุราษฎร์ธานี · 9 จังหวัด
- **หนอนเจาะเมล็ด** ลดลง 32 ไร่
พื้นที่ระบาดรวม: 124 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ยะลา, สงขลา, สระบุรี, สุโขทัย · 7 จังหวัด
- **เพลี้ยจักจั่นฝอย** ลดลง 2 ไร่
พื้นที่ระบาดรวม: 1,407 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, ตราด, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, ยะลา, ระยอง, สงขลา, สุราษฎร์ธานี · 10 จังหวัด
- **เพลี้ยหอยเกล็ด** ลดลง 1 ไร่
พื้นที่ระบาดรวม: 511 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, ตราด, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, พังงา, ยะลา, สงขลา, สุราษฎร์ธานี · 10 จังหวัด
- **เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน** เพิ่มขึ้น 22 ไร่
พื้นที่ระบาดรวม: 1,254 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, ตรัง, ตราด, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, พังงา, ยะลา, ระยอง, สงขลา, สุราษฎร์ธานี · 12 จังหวัด
- **เพลี้ยไฟ** ลดลง 3 ไร่
พื้นที่ระบาดรวม: 942 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, ตราด, นครศรีธรรมราช, พังงา, ยะลา, ระยอง, สตูล, สุราษฎร์ธานี · 10 จังหวัด

ปาล์มน้ำมัน

• ดัชนีคุณภาพ เพิ่มขึ้น 19 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 449 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, ตรัง, ตราด, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี · 10 จังหวัด

• ดัชนีแรง ลดลง 74 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 1,195 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชลบุรี, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, พังงา, ระยอง, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี · 11 จังหวัด

• หนอนปลอกเล็ก ลดลง 10 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 576 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, ชลบุรี, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พังงา, สุราษฎร์ธานี · 6 จังหวัด

• หนอนหัวดำ ลดลง 19 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 246 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครศรีธรรมราช, นุดาหาร, สกลนคร · 6 จังหวัด

• โรคทะลายเน่า ลดลง 2 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 1,108 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, ชุมพร, ตราด, นครศรีธรรมราช, ยะลา, สระแก้ว, สุราษฎร์ธานี · 7 จังหวัด

• โรคลำต้นเน่า ลดลง 22 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 11,207 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชลบุรี, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, ระยอง, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี · 12 จังหวัด

• โรคใบจุด คงที่

พื้นที่ประมาณ: 123 ไร่ · จังหวัด: ชุมพร, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ยะลา, สงขลา, สุราษฎร์ธานี · 6 จังหวัด

• โรคใบจุดสาหร่าย เพิ่มขึ้น 3 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 3,900 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, ชุมพร, ตรัง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ยะลา, สุราษฎร์ธานี · 7 จังหวัด

• โรคกิ่งแห้ง เพิ่มขึ้น 1 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 591 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, ชุมพร, ตราด, นราธิวาส, ปราจีนบุรี, พังงา, ยะลา, ระยอง, สกลนคร, สงขลา, สุราษฎร์ธานี · 11 จังหวัด

• โรคผลเน่าทุเรียน คงที่

พื้นที่ประมาณ: 188 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, ชุมพร, นราธิวาส, ยะลา · 4 จังหวัด

• โรครากเน่าโคนเน่า ลดลง 1 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 4,955 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, ตรัง, ตราด, ดาก, นครศรีธรรมราช, นนทบุรี, นราธิวาส, ประจวบคีรีขันธ์, บิดดาณ, พังงา, ภูเก็ต, ยะลา, ระนอง, ระยอง, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี, เพชรบุรี · 20 จังหวัด

• โรคราดำ ลดลง 68 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 403 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, ชุมพร, พังงา, ยะลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี · 6 จังหวัด

• โรคราสีชมพู ลดลง 2 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 186 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, ชุมพร, ตราด, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี · 5 จังหวัด

• โรคแอนแทรกคโนส ลดลง 2 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 555 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, ชุมพร, ตรัง, ยะลา · 4 จังหวัด

• โรคใบจุดสาหร่าย ลดลง 6 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 1,373 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, ตรัง, ตราด, ดาก, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ยะลา, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี · 13 จังหวัด

• โรคใบดกหรือใบไหม้ เพิ่มขึ้น 54 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 936 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, ชุมพร, ตราด, ดาก, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปราจีนบุรี, พังงา, ยะลา, สงขลา, สุราษฎร์ธานี · 12 จังหวัด

• โรคแดงทุเรียนหรือโรคแดงแอฟริกัน คงที่

พื้นที่ประมาณ: 917 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, ตราด, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ยะลา, สุราษฎร์ธานี · 8 จังหวัด

มะพร้าว

• ดัชนีวง ลดลง 14 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 733 ไร่ · จังหวัด: กรุงเทพมหานคร, ขอนแก่น, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชุมพร, ตราด, นครปฐม, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นนทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, ระยอง, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, เพชรบุรี · 20 จังหวัด

• ดัชนีแรง เพิ่มขึ้น 64 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 6,322 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, กรุงเทพมหานคร, ขอนแก่น, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชุมพร, ตรัง, ตราด, นครปฐม, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, นนทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, ภูเก็ต, มหาสารคาม, ระนอง, ระยอง, ราชบุรี, สงขลา, สตูล, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, อุบลราชธานี, เพชรบุรี · 30 จังหวัด

• หนอนหัวดำ ลดลง 364 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 24,713 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, กรุงเทพมหานคร, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ชุมพร, ตราด, นครปฐม, นครพนม, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นนทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, บิดดาณ, พังงา, ภูเก็ต, ระยอง, ราชบุรี, สกลนคร, สงขลา, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, สุโขทัย, หนองคาย, อำนาจเจริญ, อุตรดิตถ์, อุบลราชธานี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์ · 35 จังหวัด

• แมลงดำหนาม ลดลง 35 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 6,208 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี, ชลบุรี, ชัยนาท, ชุมพร, ตรัง, ตราด, นครพนม, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นนทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, พังงา, ภูเก็ต, ระยอง, สงขลา, สตูล, สมุทรสงคราม, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์ · 23 จังหวัด

• โรคสีขามะพร้าว เพิ่มขึ้น 31 ไร่

พื้นที่ประมาณ: 1,077 ไร่ · จังหวัด: กรุงเทพมหานคร, ขอนแก่น, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ชุมพร, ตราด, นครปฐม, นครพนม, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, นนทบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, สงขลา, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, เพชรบุรี · 20 จังหวัด

มังคุด

• หนอนกินใบ คงที่

พื้นที่ระบาดรวม: 626 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พังงา, ยะลา, ระยอง, สุราษฎร์ธานี · 7 จังหวัด

• เพลี้ยไฟ ลดลง 1 ไร่

พื้นที่ระบาดรวม: 241 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, ชุมพร, ตราด, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, พังงา, ยะลา · 7 จังหวัด

มันสำปะหลัง

• หนอนแมลงนูน คงที่

พื้นที่ระบาดรวม: 102 ไร่ · จังหวัด: นครสวรรค์, เพชรบูรณ์ · 2 จังหวัด

• หนู คงที่

พื้นที่ระบาดรวม: 623 ไร่ · จังหวัด: ตาก · 1 จังหวัด

• เพลี้ยหอยเกล็ด คงที่

พื้นที่ระบาดรวม: 523 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, ชลบุรี, ยโสธร, สกลนคร · 4 จังหวัด

• เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ลดลง 441 ไร่

พื้นที่ระบาดรวม: 3,581 ไร่ · จังหวัด: กาญจนบุรี, ขอนแก่น, จันทบุรี, ชลบุรี, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ยโสธร, สกลนคร, สระบุรี, สระแก้ว,หนองคาย, อุบลราชธานี · 12 จังหวัด

• โรคพุ่มแฉ ลดลง 776 ไร่

พื้นที่ระบาดรวม: 5,723 ไร่ · จังหวัด: กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์, กำแพงเพชร, จันทบุรี, ชลบุรี, ชัยภูมิ, ระยอง, ราชบุรี, สกลนคร, สระแก้ว, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี · 12 จังหวัด

• โรคโคนเน่าหัวเน่า เพิ่มขึ้น 299 ไร่

พื้นที่ระบาดรวม: 840 ไร่ · จังหวัด: มุกดาหาร, สระแก้ว · 2 จังหวัด

• โรคใบด่างมันสำปะหลัง เพิ่มขึ้น 6,675 ไร่

พื้นที่ระบาดรวม: 778,238 ไร่ · จังหวัด: กาญจนบุรี, กาฬสินธุ์, กำแพงเพชร, ขอนแก่น, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ชัยภูมิ, ตาก, นครพนม, นครราชสีมา, นครสวรรค์, บุรีรัมย์, ปราจีนบุรี, พิจิตร, มหาสารคาม, มุกดาหาร, ยโสธร, ระยอง, ราชบุรี, ร้อยเอ็ด, ลพบุรี, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สระบุรี, สระแก้ว, สุพรรณบุรี, สุรินทร์, สุโขทัย, อำนาจเจริญ, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, อุบลราชธานี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์ · 37 จังหวัด

• โรคแดง ลดลง 3,544 ไร่

พื้นที่ระบาดรวม: 12,894 ไร่ · จังหวัด: กาญจนบุรี, กำแพงเพชร, ขอนแก่น, ชลบุรี, ตาก, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ยโสธร, สกลนคร, สุรินทร์, สุโขทัย, หนองคาย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี, เพชรบูรณ์ · 16 จังหวัด

ยางพารา

• อาการเปลือกแห้ง/อาการหน้ำยางแห้ง ลดลง 35 ไร่

พื้นที่ระบาดรวม: 5,059 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, ชุมพร, ตรัง, ตราด, นครศรีธรรมราช, สกลนคร, สุราษฎร์ธานี · 7 จังหวัด

• โรครากขาว ลดลง 3 ไร่

พื้นที่ระบาดรวม: 1,359 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, ชุมพร, ตรัง, ตราด, นครศรีธรรมราช, สงขลา, สุราษฎร์ธานี · 7 จังหวัด

• โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา เพิ่มขึ้น 5,973 ไร่

พื้นที่ระบาดรวม: 989,166 ไร่ · จังหวัด: กระบี่, ชุมพร, นครพนม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, น่าน, บึงกาฬ, ประจวบคีรีขันธ์, บิดดาปี, ยะลา, ศรีสะเกษ, สงขลา, สตูล, สุราษฎร์ธานี, สุโขทัย, หนองคาย, อุตรดิตถ์, เลย · 18 จังหวัด

• โรคใบจุดนูน คงที่

พื้นที่ระบาดรวม: 1,791 ไร่ · จังหวัด: หนองคาย · 1 จังหวัด

• โรคใบร่วง ลดลง 101 ไร่

พื้นที่ระบาดรวม: 1,464 ไร่ · จังหวัด: ชุมพร, ตราด, นครศรีธรรมราช, พังงา, ระนอง, สุราษฎร์ธานี, สุโขทัย, หนองคาย · 8 จังหวัด

ลำไย

• มานลำไย คงที่

พื้นที่ระบาดรวม: 10 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, เชียงใหม่ · 2 จังหวัด

• หนอนคืบกินใบ คงที่

พื้นที่ระบาดรวม: 28 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี · 1 จังหวัด

• หนอนม้วนใบ คงที่

พื้นที่ระบาดรวม: 45 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, เชียงใหม่ · 2 จังหวัด

• เพลี้ยแป้ง คงที่

พื้นที่ระบาดรวม: 257 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, สระแก้ว, เชียงใหม่, แพร่ · 4 จังหวัด

• โรคพุ่มไม่กวาด คงที่

พื้นที่ระบาดรวม: 265 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, สระแก้ว · 2 จังหวัด

• โรคราดำ คงที่

พื้นที่ระบาดรวม: 522 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี, พะเยา, สระแก้ว, เชียงใหม่, แพร่ · 5 จังหวัด

• โรคไหม้หน่ คงที่

พื้นที่ระบาดรวม: 31 ไร่ · จังหวัด: จันทบุรี · 1 จังหวัด

สับปะรด

• โรคเหี่ยว ลดลง 13 ไร่

พื้นที่ระบาดรวม: 207 ไร่ · จังหวัด: ตราด, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี · 3 จังหวัด

อ้อย

• หนอนกออ้อย ลดลง 10 ไร่

พื้นที่ระบาดรวม: 1,187 ไร่ · จังหวัด: กาฬสินธุ์, ชลบุรี, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, อุทัยธานี · 8 จังหวัด

• หนอนแมลงนูน คงที่

พื้นที่ระบาดรวม: 230 ไร่ · จังหวัด: เพชรบูรณ์ · 1 จังหวัด

• แมลงหริขาวอ้อย เพิ่มขึ้น 43,607 ไร่

พื้นที่ระบาดรวม: 43,607 ไร่ · จังหวัด: นครสวรรค์, เพชรบูรณ์ · 2 จังหวัด

• โรคแสด ๑ คงที่

พื้นที่ระบาดรวม: 566 ไร่ · จังหวัด: สุโขทัย, อุทัยธานี · 2 จังหวัด

• โรคใบขาวอ้อย เพิ่มขึ้น 251 ไร่

พื้นที่ระบาดรวม: 15,037 ไร่ · จังหวัด: กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชลบุรี, นครราชสีมา, มหาสารคาม, อำนาจเจริญ, อุตรดิตถ์ · 7 จังหวัด

แหล่งข้อมูล

- ส่วนอุตุนิยมหาวิทยาลัยเกษตร กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมหาวิทยาลัย กรมอุตุนิยมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์